

表 829 HDF希釈方法 nPCR(g/kg/day)別 (オンラインHDF 男性 透析回数週3回 透析歴2年以上)

nPCR	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	17 (100.0)				17 (100.0)		3	20
0.4～ (%)	952 (95.0)	47 (4.7)		3 (0.3)	1,002 (100.0)		51	1,053
0.6～ (%)	7,661 (95.3)	360 (4.5)		16 (0.2)	8,037 (100.0)		422	8,459
0.8～ (%)	11,025 (95.3)	523 (4.5)		18 (0.2)	11,566 (100.0)		659	12,225
1.0～ (%)	4,014 (94.8)	212 (5.0)		9 (0.2)	4,235 (100.0)		260	4,495
1.2～ (%)	574 (94.3)	34 (5.6)		1 (0.2)	609 (100.0)		26	635
1.4～ (%)	43 (91.5)	4 (8.5)			47 (100.0)		3	50
1.6～ (%)	2 (100.0)				2 (100.0)			2
1.8～ (%)	3 (100.0)				3 (100.0)			3
2.0～ (%)	1 (100.0)				1 (100.0)			1
合計 (%)	24,292 (95.2)	1,180 (4.6)		47 (0.2)	25,519 (100.0)		1,424	26,943
記載なし (%)	2,554 (95.9)	86 (3.2)	1 (0.0)	21 (0.8)	2,662 (100.0)		214	2,876
総計 (%)	26,846 (95.3)	1,266 (4.5)	1 (0.0)	68 (0.2)	28,181 (100.0)		1,638	29,819
平均	0.86	0.87		0.85	0.86		0.86	0.86
標準偏差	0.16	0.16		0.16	0.16		0.16	0.16

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1725##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査