

表 830 HDF希釈方法 nPCR(g/kg/day)別 (オンラインHDF 女性 透析回数週3回 透析歴2年以上)

n P C R	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	22 (100.0)				22 (100.0)		1	23
0.4～ (%)	440 (94.4)	22 (4.7)		4 (0.9)	466 (100.0)		35	501
0.6～ (%)	3,336 (95.1)	158 (4.5)		15 (0.4)	3,509 (100.0)		230	3,739
0.8～ (%)	5,949 (94.8)	307 (4.9)		20 (0.3)	6,276 (100.0)		385	6,661
1.0～ (%)	2,999 (95.3)	139 (4.4)		9 (0.3)	3,147 (100.0)		204	3,351
1.2～ (%)	591 (94.1)	34 (5.4)		3 (0.5)	628 (100.0)		25	653
1.4～ (%)	62 (93.9)	3 (4.5)		1 (1.5)	66 (100.0)		2	68
1.6～ (%)	9 (90.0)	1 (10.0)			10 (100.0)			10
1.8～ (%)	1 (100.0)				1 (100.0)			1
2.0～ (%)	1 (100.0)				1 (100.0)		1	2
合計 (%)	13,410 (94.9)	664 (4.7)		52 (0.4)	14,126 (100.0)		883	15,009
記載なし (%)	1,366 (96.1)	38 (2.7)		18 (1.3)	1,422 (100.0)	1	124	1,547
総計 (%)	14,776 (95.0)	702 (4.5)		70 (0.5)	15,548 (100.0)	1	1,007	16,556
平均	0.90	0.90		0.88	0.90		0.89	0.90
標準偏差	0.18	0.18		0.21	0.18		0.18	0.18

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1726##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査