

表 831 HDF希釈方法 透析後体重(kg)別 (オンラインHDF 男性 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)								
20～ (%)	1 (33.3)	2 (66.7)			3 (100.0)		1	4
30～ (%)	262 (96.0)	11 (4.0)			273 (100.0)		21	294
40～ (%)	3,517 (95.2)	169 (4.6)	1 (0.0)	6 (0.2)	3,693 (100.0)		207	3,900
50～ (%)	9,006 (95.0)	447 (4.7)		26 (0.3)	9,479 (100.0)		569	10,048
60～ (%)	7,618 (95.4)	354 (4.4)		10 (0.1)	7,982 (100.0)		457	8,439
70～ (%)	3,573 (95.8)	153 (4.1)		5 (0.1)	3,731 (100.0)		204	3,935
80～ (%)	1,401 (94.8)	76 (5.1)		1 (0.1)	1,478 (100.0)		77	1,555
90～ (%)	550 (93.9)	31 (5.3)		5 (0.9)	586 (100.0)		29	615
100～ (%)	197 (96.6)	7 (3.4)			204 (100.0)		13	217
110～ (%)	83 (94.3)	5 (5.7)			88 (100.0)		1	89
120～ (%)	43 (87.8)	6 (12.2)			49 (100.0)		2	51
合計 (%)	26,251 (95.2)	1,261 (4.6)	1 (0.0)	53 (0.2)	27,566 (100.0)		1,581	29,147
記載なし (%)	595 (96.7)	5 (0.8)		15 (2.4)	615 (100.0)		57	672
総計 (%)	26,846 (95.3)	1,266 (4.5)	1 (0.0)	68 (0.2)	28,181 (100.0)		1,638	29,819
平均	62.16	62.35	48.30	61.63	62.16		61.57	62.13
標準偏差	12.75	13.45		13.19	12.79		12.35	12.76

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D1721##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査