

表 832 HDF希釈方法 透析後体重(kg)別 (オンラインHDF 女性 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)								
20～ (%)	62 (92.5)	5 (7.5)			67 (100.0)		5	72
30～ (%)	2,266 (95.1)	104 (4.4)		14 (0.6)	2,384 (100.0)	1	138	2,523
40～ (%)	6,138 (94.4)	338 (5.2)		28 (0.4)	6,504 (100.0)		454	6,958
50～ (%)	3,838 (95.4)	175 (4.3)		10 (0.2)	4,023 (100.0)		241	4,264
60～ (%)	1,420 (97.1)	41 (2.8)		2 (0.1)	1,463 (100.0)		86	1,549
70～ (%)	480 (95.4)	23 (4.6)			503 (100.0)		29	532
80～ (%)	161 (95.8)	7 (4.2)			168 (100.0)		12	180
90～ (%)	53 (94.6)	2 (3.6)		1 (1.8)	56 (100.0)		5	61
100～ (%)	13 (100.0)				13 (100.0)			13
110～ (%)	5 (100.0)				5 (100.0)			5
120～ (%)	2 (100.0)				2 (100.0)			2
合計 (%)	14,438 (95.1)	695 (4.6)		55 (0.4)	15,188 (100.0)	1	970	16,159
記載なし (%)	338 (93.9)	7 (1.9)		15 (4.2)	360 (100.0)		37	397
総計 (%)	14,776 (95.0)	702 (4.5)		70 (0.5)	15,548 (100.0)	1	1,007	16,556
平均	49.61	48.53		46.11	49.55	35.70	49.38	49.54
標準偏差	10.74	10.05		10.01	10.71		10.39	10.69

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D1722##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査