

表 833 HDF希釈方法 透析前アルブミン濃度(g/dL)別 (オンラインHDF 透析回数週3回)

透析前 アルブミン濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	12 (100.0)				12 (100.0)			12
1.5~ (%)	52 (96.3)	2 (3.7)			54 (100.0)		8	62
2.0~ (%)	329 (96.5)	8 (2.3)		4 (1.2)	341 (100.0)		16	357
2.5~ (%)	1,764 (94.2)	103 (5.5)		5 (0.3)	1,872 (100.0)		105	1,977
3.0~ (%)	11,727 (95.1)	559 (4.5)	1 (0.0)	45 (0.4)	12,332 (100.0)	1	761	13,094
3.5~ (%)	25,580 (95.2)	1,218 (4.5)		67 (0.2)	26,865 (100.0)		1,470	28,335
4.0~ (%)	7,353 (95.8)	312 (4.1)		11 (0.1)	7,676 (100.0)		414	8,090
4.5~ (%)	313 (96.9)	10 (3.1)			323 (100.0)		22	345
5.0~ (%)	21 (100.0)				21 (100.0)			21
合計 (%)	47,151 (95.3)	2,212 (4.5)	1 (0.0)	132 (0.3)	49,496 (100.0)	1	2,796	52,293
記載なし (%)	1,306 (96.0)	15 (1.1)		40 (2.9)	1,361 (100.0)		178	1,539
総計 (%)	48,457 (95.3)	2,227 (4.4)	1 (0.0)	172 (0.3)	50,857 (100.0)	1	2,974	53,832
平均	3.61	3.59	3.20	3.47	3.61	3.30	3.59	3.61
標準偏差	0.38	0.37		0.40	0.38		0.38	0.38

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1727##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査