

表 834 HDF希釈方法 透析前CRP濃度(mg/dL)別 (オンラインHDF 透析回数週3回)

透析前CRP濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	24,656 (95.1)	1,183 (4.6)		75 (0.3)	25,914 (100.0)	1	1,468	27,383
0.2～ (%)	8,252 (95.5)	364 (4.2)	1 (0.0)	23 (0.3)	8,640 (100.0)		487	9,127
0.5～ (%)	4,097 (96.0)	160 (3.7)		10 (0.2)	4,267 (100.0)		265	4,532
1.0～ (%)	2,553 (95.0)	120 (4.5)		13 (0.5)	2,686 (100.0)		170	2,856
2.0～ (%)	1,373 (95.0)	67 (4.6)		6 (0.4)	1,446 (100.0)		105	1,551
4.0～ (%)	463 (95.1)	23 (4.7)		1 (0.2)	487 (100.0)		18	505
6.0～ (%)	202 (95.7)	9 (4.3)			211 (100.0)		11	222
8.0～ (%)	112 (96.6)	4 (3.4)			116 (100.0)		9	125
10.0～ (%)	105 (96.3)	4 (3.7)			109 (100.0)		13	122
15.0～ (%)	60 (95.2)	3 (4.8)			63 (100.0)		6	69
合計 (%)	41,873 (95.3)	1,937 (4.4)	1 (0.0)	128 (0.3)	43,939 (100.0)	1	2,552	46,492
記載なし (%)	6,584 (95.2)	290 (4.2)		44 (0.6)	6,918 (100.0)		422	7,340
総計 (%)	48,457 (95.3)	2,227 (4.4)	1 (0.0)	172 (0.3)	50,857 (100.0)	1	2,974	53,832
平均	0.52	0.51	0.45	0.48	0.52	0.07	0.59	0.52
標準偏差	1.41	1.30		0.82	1.41		1.85	1.44

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1728##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査