

表 835 HDF希釈方法 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (オンラインHDF 透析回数週3回)

透析前補正カルシウム濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	162 (95.9)	7 (4.1)			169 (100.0)		8	177
7.0～ (%)	302 (96.5)	11 (3.5)			313 (100.0)		17	330
7.5～ (%)	1,277 (95.9)	49 (3.7)		6 (0.5)	1,332 (100.0)		65	1,397
8.0～ (%)	3,509 (96.7)	111 (3.1)		7 (0.2)	3,627 (100.0)		183	3,810
8.4～ (%)	1,479 (95.4)	67 (4.3)		4 (0.3)	1,550 (100.0)		70	1,620
8.5～ (%)	11,845 (95.4)	533 (4.3)	1 (0.0)	34 (0.3)	12,413 (100.0)		686	13,099
9.0～ (%)	14,105 (95.1)	680 (4.6)		44 (0.3)	14,829 (100.0)	1	834	15,664
9.5～ (%)	8,938 (94.7)	478 (5.1)		22 (0.2)	9,438 (100.0)		569	10,007
10.0～ (%)	1,115 (94.7)	61 (5.2)		2 (0.2)	1,178 (100.0)		64	1,242
10.1～ (%)	2,598 (95.1)	128 (4.7)		5 (0.2)	2,731 (100.0)		166	2,897
10.5～ (%)	1,170 (95.1)	56 (4.6)		4 (0.3)	1,230 (100.0)		77	1,307
11.0～ (%)	354 (94.9)	17 (4.6)		2 (0.5)	373 (100.0)		24	397
11.5～ (%)	112 (94.9)	5 (4.2)		1 (0.8)	118 (100.0)		4	122
12.0～ (%)	64 (90.1)	6 (8.5)		1 (1.4)	71 (100.0)		5	76
合計 (%)	47,030 (95.3)	2,209 (4.5)	1 (0.0)	132 (0.3)	49,372 (100.0)	1	2,772	52,145
記載なし (%)	1,427 (96.1)	18 (1.2)		40 (2.7)	1,485 (100.0)		202	1,687
総計 (%)	48,457 (95.3)	2,227 (4.4)	1 (0.0)	172 (0.3)	50,857 (100.0)	1	2,974	53,832
平均	9.14	9.21	8.60	9.16	9.14	9.30	9.18	9.15
標準偏差	0.72	0.70		0.77	0.72		0.72	0.72

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1729##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査