

表 838 HDF希釈方法 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL)別 (オンラインHDF 透析回数週3回)

透析前 ヘモグロビン濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
5未満 (%)	16 (88.9)	2 (11.1)			18 (100.0)		1	19
5~ (%)	25 (96.2)	1 (3.8)			26 (100.0)		2	28
6~ (%)	90 (93.8)	6 (6.3)			96 (100.0)		9	105
7~ (%)	393 (95.6)	16 (3.9)		2 (0.5)	411 (100.0)		25	436
8~ (%)	1,562 (95.6)	67 (4.1)		5 (0.3)	1,634 (100.0)		88	1,722
9~ (%)	6,238 (94.9)	312 (4.7)	1 (0.0)	20 (0.3)	6,571 (100.0)	1	390	6,962
10~ (%)	15,732 (95.5)	705 (4.3)		37 (0.2)	16,474 (100.0)		993	17,467
11~ (%)	14,819 (95.2)	705 (4.5)		42 (0.3)	15,566 (100.0)		789	16,355
12~ (%)	5,870 (95.1)	285 (4.6)		18 (0.3)	6,173 (100.0)		310	6,483
13~ (%)	1,698 (95.2)	81 (4.5)		4 (0.2)	1,783 (100.0)		79	1,862
14~ (%)	704 (96.4)	24 (3.3)		2 (0.3)	730 (100.0)		40	770
合計 (%)	47,147 (95.3)	2,204 (4.5)	1 (0.0)	130 (0.3)	49,482 (100.0)	1	2,726	52,209
記載なし (%)	1,310 (95.3)	23 (1.7)		42 (3.1)	1,375 (100.0)		248	1,623
総計 (%)	48,457 (95.3)	2,227 (4.4)	1 (0.0)	172 (0.3)	50,857 (100.0)	1	2,974	53,832
平均	10.95	10.95	9.50	10.97	10.95	9.10	10.86	10.95
標準偏差	1.23	1.21		1.33	1.23		1.21	1.23

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1732##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査