

表 839 HDF希釈方法 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (オンラインHDF 透析回数週3回)

総コレステロール濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	1,162 (95.3)	49 (4.0)		8 (0.7)	1,219 (100.0)		65	1,284
100～ (%)	3,661 (95.4)	167 (4.4)		11 (0.3)	3,839 (100.0)		224	4,063
120～ (%)	7,432 (95.6)	318 (4.1)		22 (0.3)	7,772 (100.0)		457	8,229
140～ (%)	9,107 (95.5)	404 (4.2)		25 (0.3)	9,536 (100.0)	1	527	10,064
160～ (%)	8,088 (95.1)	392 (4.6)		25 (0.3)	8,505 (100.0)		558	9,063
180～ (%)	5,375 (95.0)	271 (4.8)	1 (0.0)	11 (0.2)	5,658 (100.0)		381	6,039
200～ (%)	2,811 (94.3)	165 (5.5)		4 (0.1)	2,980 (100.0)		214	3,194
220～ (%)	1,333 (94.3)	79 (5.6)		1 (0.1)	1,413 (100.0)		80	1,493
240～ (%)	540 (94.6)	28 (4.9)		3 (0.5)	571 (100.0)		37	608
260～ (%)	324 (93.1)	23 (6.6)		1 (0.3)	348 (100.0)		23	371
合計 (%)	39,833 (95.2)	1,896 (4.5)	1 (0.0)	111 (0.3)	41,841 (100.0)	1	2,566	44,408
記載なし (%)	8,624 (95.7)	331 (3.7)		61 (0.7)	9,016 (100.0)		408	9,424
総計 (%)	48,457 (95.3)	2,227 (4.4)	1 (0.0)	172 (0.3)	50,857 (100.0)	1	2,974	53,832
平均	159.09	162.33	182.00	152.62	159.22	158.00	161.17	159.33
標準偏差	35.68	36.81		36.22	35.74		35.76	35.74

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1733##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査