

表 841 HDF希釈方法 年齢(歳)別 (IHDF 透析回数週3回)

| 年齢 | 前希釈 | 後希釈 | 前・後希釈 | その他 | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|-------|-------|--------|
| 15歳未満 (%) | | | | | | | | |
| 15歳～ (%) | 4 (23.5) | | | 13 (76.5) | 17 (100.0) | | 15 | 32 |
| 30歳～ (%) | 21 (9.7) | 6 (2.8) | 11 (5.1) | 179 (82.5) | 217 (100.0) | 1 | 146 | 364 |
| 45歳～ (%) | 124 (14.3) | 26 (3.0) | 18 (2.1) | 702 (80.7) | 870 (100.0) | 3 | 698 | 1,571 |
| 60歳～ (%) | 362 (15.9) | 70 (3.1) | 33 (1.5) | 1,808 (79.5) | 2,273 (100.0) | 3 | 2,197 | 4,473 |
| 75歳～ (%) | 357 (20.5) | 65 (3.7) | 20 (1.2) | 1,296 (74.6) | 1,738 (100.0) | 2 | 1,664 | 3,404 |
| 90歳～ (%) | 29 (27.1) | 2 (1.9) | | 76 (71.0) | 107 (100.0) | | 106 | 213 |
| 合計 (%) | 897 (17.2) | 169 (3.2) | 82 (1.6) | 4,074 (78.0) | 5,222 (100.0) | 9 | 4,826 | 10,057 |
| 不明 (%) | | | | | | | | |
| 記載なし (%) | | | | | | | | |
| 総計 (%) | 897 (17.2) | 169 (3.2) | 82 (1.6) | 4,074 (78.0) | 5,222 (100.0) | 9 | 4,826 | 10,057 |
| 平均 | 70.98 | 70.02 | 64.34 | 68.35 | 68.79 | 61.67 | 69.70 | 69.22 |
| 標準偏差 | 12.10 | 11.78 | 13.14 | 12.43 | 12.42 | 13.58 | 11.86 | 12.16 |

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

#D1811##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査