

表 842 HDF希釈方法 透析歴(年)別 (IHDF 透析回数週3回)

透析歴	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
2年未満	220	33	12	889	1,154	4	1,027	2,185
(%)	(19.1)	(2.9)	(1.0)	(77.0)	(100.0)			
2年～	239	40	25	1,038	1,342		1,324	2,666
(%)	(17.8)	(3.0)	(1.9)	(77.3)	(100.0)			
5年～	207	52	17	1,021	1,297		1,264	2,561
(%)	(16.0)	(4.0)	(1.3)	(78.7)	(100.0)			
10年～	115	21	5	573	714	2	578	1,294
(%)	(16.1)	(2.9)	(0.7)	(80.3)	(100.0)			
15年～	68	6	6	281	361	2	300	663
(%)	(18.8)	(1.7)	(1.7)	(77.8)	(100.0)			
20年～	22	9	3	153	187		165	352
(%)	(11.8)	(4.8)	(1.6)	(81.8)	(100.0)			
25年～	13	4	11	72	100		86	186
(%)	(13.0)	(4.0)	(11.0)	(72.0)	(100.0)			
30年～	4	3	1	30	38		47	85
(%)	(10.5)	(7.9)	(2.6)	(78.9)	(100.0)			
35年～	7	1	2	14	24	1	22	47
(%)	(29.2)	(4.2)	(8.3)	(58.3)	(100.0)			
40年～	2			3	5		7	12
(%)	(40.0)			(60.0)	(100.0)			
合計	897	169	82	4,074	5,222	9	4,820	10,051
(%)	(17.2)	(3.2)	(1.6)	(78.0)	(100.0)			
不明							6	6
(%)								
記載なし								
(%)								
総計	897	169	82	4,074	5,222	9	4,826	10,057
(%)	(17.2)	(3.2)	(1.6)	(78.0)	(100.0)			
平均	6.68	7.46	10.28	7.05	7.05	10.89	6.86	6.96
標準偏差	6.97	7.62	10.32	6.94	7.04	12.47	7.01	7.04

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1812##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査