

表 844 HDF希釈方法 透析時間(分/回)別 (IHDF 透析回数週3回)

透析時間分	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
180未満 (%)	2 (8.7)	4 (17.4)		17 (73.9)	23 (100.0)		16	39
180～ (%)	155 (26.5)	17 (2.9)	17 (2.9)	395 (67.6)	584 (100.0)		489	1,073
210～ (%)	89 (17.0)	36 (6.9)	3 (0.6)	397 (75.6)	525 (100.0)	1	407	933
240～ (%)	596 (16.7)	99 (2.8)	58 (1.6)	2,811 (78.9)	3,564 (100.0)	2	3,326	6,892
270～ (%)	19 (7.1)	10 (3.7)	2 (0.7)	237 (88.4)	268 (100.0)	3	252	523
300～ (%)	32 (13.1)	3 (1.2)	2 (0.8)	208 (84.9)	245 (100.0)	3	251	499
330～ (%)	2 (40.0)			3 (60.0)	5 (100.0)		8	13
360～ (%)				4 (100.0)	4 (100.0)		14	18
390～ (%)	1 (50.0)			1 (50.0)	2 (100.0)			2
420～ (%)							57	57
合計 (%)	896 (17.2)	169 (3.2)	82 (1.6)	4,073 (78.0)	5,220 (100.0)	9	4,820	10,049
記載なし (%)	1 (50.0)			1 (50.0)	2 (100.0)		6	8
総計 (%)	897 (17.2)	169 (3.2)	82 (1.6)	4,074 (78.0)	5,222 (100.0)	9	4,826	10,057
平均	230.25	229.73	229.90	237.39	235.80	268.89	241.39	238.51
標準偏差	28.99	27.76	27.58	26.59	27.23	27.59	47.02	38.14

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1814##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査