

表 845 HDF希釈方法 血流量(ml/分)別 (IHDF 透析回数週3回)

血流量	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)				7	8		11	19
100～ (%)	1 (12.5)			(87.5)	(100.0)			
120～ (%)	8 (16.3)	3 (6.1)		38 (77.6)	49 (100.0)		15	64
140～ (%)	112 (28.6)	21 (5.4)	2 (0.5)	257 (65.6)	392 (100.0)		284	676
160～ (%)	13 (7.7)	11 (6.5)		144 (85.7)	168 (100.0)		79	247
180～ (%)	114 (17.9)	31 (4.9)	2 (0.3)	491 (77.0)	638 (100.0)		614	1,252
200～ (%)	410 (21.7)	65 (3.4)	31 (1.6)	1,383 (73.2)	1,889 (100.0)	3	2,038	3,930
220～ (%)	116 (16.5)	23 (3.3)	17 (2.4)	549 (77.9)	705 (100.0)	4	761	1,470
240～ (%)	105 (10.2)	12 (1.2)	17 (1.6)	898 (87.0)	1,032 (100.0)	2	601	1,635
260～ (%)	7 (9.7)		4 (5.6)	61 (84.7)	72 (100.0)		30	102
280～ (%)	7 (10.1)	2 (2.9)	2 (2.9)	58 (84.1)	69 (100.0)		59	128
300～ (%)	2 (1.4)	1 (0.7)	7 (4.8)	136 (93.2)	146 (100.0)		62	208
350～ (%)	1 (4.5)			21 (95.5)	22 (100.0)		8	30
400～ (%)				23 (100.0)	23 (100.0)		15	38
合計 (%)	896 (17.2)	169 (3.2)	82 (1.6)	4,066 (78.0)	5,213 (100.0)	9	4,577	9,799
記載なし (%)	1 (11.1)			8 (88.9)	9 (100.0)		249	258
総計 (%)	897 (17.2)	169 (3.2)	82 (1.6)	4,074 (78.0)	5,222 (100.0)	9	4,826	10,057
平均	200.32	194.70	228.05	214.24	211.43	224.44	207.32	209.52
標準偏差	30.73	30.98	35.05	42.21	40.53	20.07	32.61	37.08

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1815##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査