

表 846 HDF希釈方法 1セッションあたりの置換液量(L)別 (IHDF 透析回数週3回)

1セッションあたりの置換液量	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)								
0.2~ (%)	112 (16.7)			557 (83.3)	669 (100.0)			669
0.8~ (%)	281 (17.0)	18 (1.1)	70 (4.2)	1,286 (77.7)	1,655 (100.0)			1,655
1.2~ (%)	288 (16.4)	100 (5.7)	9 (0.5)	1,358 (77.4)	1,755 (100.0)			1,755
1.6~ (%)	40 (22.2)	3 (1.7)		137 (76.1)	180 (100.0)			180
2.0~ (%)	32 (17.6)	19 (10.4)	2 (1.1)	129 (70.9)	182 (100.0)	8		190
2.4~ (%)	5 (8.6)	21 (36.2)		32 (55.2)	58 (100.0)			58
合計 (%)	758 (16.8)	161 (3.6)	81 (1.8)	3,499 (77.8)	4,499 (100.0)	8		4,507
記載なし (%)	139 (19.2)	8 (1.1)	1 (0.1)	575 (79.5)	723 (100.0)	1	4,826	5,550
総計 (%)	897 (17.2)	169 (3.2)	82 (1.6)	4,074 (78.0)	5,222 (100.0)	9	4,826	10,057
平均	1.17	1.73	1.07	1.14	1.17	2.00		1.17
標準偏差	0.42	0.78	0.20	0.47	0.48			0.48

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1816##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査