

表 847 HDF希釈方法 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別 (IHDF 男性 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前 クレアチニン濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	1 (50.0)			1 (50.0)	2 (100.0)		4	6
2~ (%)	5 (41.7)	1 (8.3)		6 (50.0)	12 (100.0)		20	32
4~ (%)	15 (27.3)		1 (1.8)	39 (70.9)	55 (100.0)		81	136
6~ (%)	51 (19.5)	11 (4.2)	4 (1.5)	195 (74.7)	261 (100.0)		265	526
8~ (%)	117 (19.8)	23 (3.9)	11 (1.9)	440 (74.5)	591 (100.0)	1	567	1,159
10~ (%)	112 (15.3)	23 (3.2)	9 (1.2)	586 (80.3)	730 (100.0)	3	620	1,353
12~ (%)	60 (11.6)	18 (3.5)	5 (1.0)	436 (84.0)	519 (100.0)		491	1,010
14~ (%)	29 (12.1)	6 (2.5)	4 (1.7)	200 (83.7)	239 (100.0)		180	419
16~ (%)	7 (9.2)	3 (3.9)	1 (1.3)	65 (85.5)	76 (100.0)		50	126
合計 (%)	397 (16.0)	85 (3.4)	35 (1.4)	1,968 (79.2)	2,485 (100.0)	4	2,278	4,767
記載なし (%)	3 (5.3)	4 (7.0)		50 (87.7)	57 (100.0)		43	100
総計 (%)	400 (15.7)	89 (3.5)	35 (1.4)	2,018 (79.4)	2,542 (100.0)	4	2,321	4,867
平均	10.21	10.70	10.73	11.03	10.89	11.13	10.58	10.74
標準偏差	2.72	2.80	2.61	2.67	2.69	1.11	2.71	2.71

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1817##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査