

表 848 HDF希釈方法 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別 (IHDF 女性 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前 クレアチニン濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)				1 (100.0)	1 (100.0)			1
2~ (%)	3 (23.1)			10 (76.9)	13 (100.0)		22	35
4~ (%)	23 (25.6)		3 (3.3)	64 (71.1)	90 (100.0)		122	212
6~ (%)	61 (19.1)	6 (1.9)	8 (2.5)	245 (76.6)	320 (100.0)		322	642
8~ (%)	105 (19.7)	13 (2.4)	11 (2.1)	403 (75.8)	532 (100.0)	1	516	1,049
10~ (%)	65 (16.9)	20 (5.2)	6 (1.6)	294 (76.4)	385 (100.0)		336	721
12~ (%)	15 (12.0)	5 (4.0)	6 (4.8)	99 (79.2)	125 (100.0)		117	242
14~ (%)	2 (9.5)	2 (9.5)	1 (4.8)	16 (76.2)	21 (100.0)		16	37
16~ (%)								
合計 (%)	274 (18.4)	46 (3.1)	35 (2.4)	1,132 (76.1)	1,487 (100.0)	1	1,451	2,939
記載なし (%)	3 (7.7)	1 (2.6)		35 (89.7)	39 (100.0)		21	60
総計 (%)	277 (18.2)	47 (3.1)	35 (2.3)	1,167 (76.5)	1,526 (100.0)	1	1,472	2,999
平均	8.82	10.18	9.35	9.18	9.15	9.80	8.92	9.04
標準偏差	2.12	2.02	2.68	2.17	2.18		2.24	2.21

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1818##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査