

表 849 HDF希釈方法 %クレアチニン産生速度(%)別 (IHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上)

%クレアチニン 産生速度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	51 (20.7)	10 (4.1)	3 (1.2)	182 (74.0)	246 (100.0)		325	571
60～ (%)	43 (21.6)	7 (3.5)	3 (1.5)	146 (73.4)	199 (100.0)		196	395
70～ (%)	72 (21.1)	11 (3.2)		258 (75.7)	341 (100.0)	1	317	659
80～ (%)	84 (16.8)	13 (2.6)		404 (80.6)	501 (100.0)		401	902
90～ (%)	98 (17.2)	23 (4.0)	1 (0.2)	448 (78.6)	570 (100.0)		509	1,079
100～ (%)	96 (15.9)	22 (3.7)	3 (0.5)	481 (79.9)	602 (100.0)	1	506	1,109
110～ (%)	65 (11.9)	20 (3.7)	3 (0.5)	458 (83.9)	546 (100.0)	2	443	991
120～ (%)	50 (13.6)	15 (4.1)		304 (82.4)	369 (100.0)	1	317	687
130～ (%)	30 (13.6)	5 (2.3)	1 (0.5)	185 (83.7)	221 (100.0)		178	399
140～ (%)	16 (11.5)	5 (3.6)		118 (84.9)	139 (100.0)		111	250
合計 (%)	605 (16.2)	131 (3.5)	14 (0.4)	2,984 (79.9)	3,734 (100.0)	5	3,303	7,042
記載なし (%)	72 (21.6)	5 (1.5)	56 (16.8)	201 (60.2)	334 (100.0)		490	824
総計 (%)	677 (16.6)	136 (3.3)	70 (1.7)	3,185 (78.3)	4,068 (100.0)	5	3,793	7,866
平均	94.34	98.99	86.94	99.76	98.81	106.54	96.16	97.57
標準偏差	25.51	24.59	32.11	24.42	24.72	20.24	26.71	25.70

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1819##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査