

表 852 HDF希釈方法 nPCR(g/kg/day)別 (IHDF 男性 透析回数週3回 透析歴2年以上)

nPCR	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	2 (40.0)			3 (60.0)	5 (100.0)		4	9
0.4～ (%)	39 (28.9)	4 (3.0)		92 (68.1)	135 (100.0)		125	260
0.6～ (%)	156 (18.9)	29 (3.5)	2 (0.2)	638 (77.3)	825 (100.0)	1	695	1,521
0.8～ (%)	130 (13.2)	36 (3.7)	3 (0.3)	813 (82.8)	982 (100.0)	1	886	1,869
1.0～ (%)	47 (12.7)	13 (3.5)		311 (83.8)	371 (100.0)	1	260	632
1.2～ (%)	4 (8.9)	3 (6.7)		38 (84.4)	45 (100.0)	1	44	90
1.4～ (%)				4 (100.0)	4 (100.0)		6	10
1.6～ (%)								
1.8～ (%)								
2.0～ (%)								
合計 (%)	378 (16.0)	85 (3.6)	5 (0.2)	1,899 (80.2)	2,367 (100.0)	4	2,020	4,391
記載なし (%)	22 (12.6)	4 (2.3)	30 (17.1)	119 (68.0)	175 (100.0)		301	476
総計 (%)	400 (15.7)	89 (3.5)	35 (1.4)	2,018 (79.4)	2,542 (100.0)	4	2,321	4,867
平均	0.80	0.86	0.84	0.85	0.84	0.98	0.84	0.84
標準偏差	0.17	0.17	0.09	0.16	0.16	0.24	0.16	0.16

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

##D1822##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査