

表 853 HDF希釈方法 nPCR(g/kg/day)別 (IHDF 女性 透析回数週3回 透析歴2年以上)

nPCR	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)			1 (100.0)		1 (100.0)		2	3
0.4～ (%)	15 (26.8)		1 (1.8)	40 (71.4)	56 (100.0)		56	112
0.6～ (%)	81 (19.9)	10 (2.5)	4 (1.0)	313 (76.7)	408 (100.0)	1	386	795
0.8～ (%)	114 (18.9)	22 (3.6)	3 (0.5)	465 (77.0)	604 (100.0)		564	1,168
1.0～ (%)	32 (12.3)	13 (5.0)		216 (82.8)	261 (100.0)		241	502
1.2～ (%)	11 (18.3)	1 (1.7)		48 (80.0)	60 (100.0)		46	106
1.4～ (%)	1 (9.1)			10 (90.9)	11 (100.0)		6	17
1.6～ (%)							1	1
1.8～ (%)								
2.0～ (%)								
合計 (%)	254 (18.1)	46 (3.3)	9 (0.6)	1,092 (77.9)	1,401 (100.0)	1	1,302	2,704
記載なし (%)	23 (18.4)	1 (0.8)	26 (20.8)	75 (60.0)	125 (100.0)		170	295
総計 (%)	277 (18.2)	47 (3.1)	35 (2.3)	1,167 (76.5)	1,526 (100.0)	1	1,472	2,999
平均	0.85	0.93	0.74	0.88	0.88	0.79	0.87	0.88
標準偏差	0.18	0.15	0.19	0.18	0.18		0.18	0.18

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1823##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査