

表 854 HDF希釈方法 透析後体重(kg)別 (IHDF 男性 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)					1			1
20～ (%)	1 (100.0)				(100.0)			1
30～ (%)	8 (22.2)			28 (77.8)	36 (100.0)		49	85
40～ (%)	91 (21.4)	11 (2.6)	8 (1.9)	315 (74.1)	425 (100.0)	1	432	858
50～ (%)	155 (17.5)	37 (4.2)	9 (1.0)	685 (77.3)	886 (100.0)	3	819	1,708
60～ (%)	96 (13.3)	26 (3.6)	11 (1.5)	587 (81.5)	720 (100.0)		629	1,349
70～ (%)	28 (10.3)	8 (2.9)	2 (0.7)	234 (86.0)	272 (100.0)		239	511
80～ (%)	10 (12.2)	2 (2.4)	2 (2.4)	68 (82.9)	82 (100.0)		80	162
90～ (%)	7 (17.1)		2 (4.9)	32 (78.0)	41 (100.0)		18	59
100～ (%)	2 (11.8)	1 (5.9)		14 (82.4)	17 (100.0)		9	26
110～ (%)				3 (100.0)	3 (100.0)		4	7
120～ (%)			1 (100.0)		1 (100.0)		1	2
合計 (%)	398 (16.0)	85 (3.4)	35 (1.4)	1,966 (79.1)	2,484 (100.0)	4	2,280	4,768
記載なし (%)	2 (3.4)	4 (6.9)		52 (89.7)	58 (100.0)		41	99
総計 (%)	400 (15.7)	89 (3.5)	35 (1.4)	2,018 (79.4)	2,542 (100.0)	4	2,321	4,867
平均	57.61	60.46	62.23	60.55	60.10	51.70	59.21	59.67
標準偏差	11.39	10.35	17.53	11.92	11.93	4.54	11.62	11.79

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D1824##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査