

表 855 HDF希釈方法 透析後体重(kg)別 (IHDF 女性 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)								
20~ (%)	4 (23.5)	1 (5.9)	1 (5.9)	11 (64.7)	17 (100.0)		9	26
30~ (%)	66 (22.8)	8 (2.8)	12 (4.1)	204 (70.3)	290 (100.0)	1	279	570
40~ (%)	111 (17.6)	19 (3.0)	6 (0.9)	496 (78.5)	632 (100.0)		603	1,235
50~ (%)	66 (18.5)	14 (3.9)	11 (3.1)	266 (74.5)	357 (100.0)		379	736
60~ (%)	21 (16.2)	4 (3.1)	4 (3.1)	101 (77.7)	130 (100.0)		136	266
70~ (%)	4 (10.5)		1 (2.6)	33 (86.8)	38 (100.0)		32	70
80~ (%)	1 (7.1)			13 (92.9)	14 (100.0)		10	24
90~ (%)				8 (100.0)	8 (100.0)		6	14
100~ (%)	1 (100.0)				1 (100.0)			1
110~ (%)								
120~ (%)								
合計 (%)	274 (18.4)	46 (3.1)	35 (2.4)	1,132 (76.1)	1,487 (100.0)	1	1,454	2,942
記載なし (%)	3 (7.7)	1 (2.6)		35 (89.7)	39 (100.0)		18	57
総計 (%)	277 (18.2)	47 (3.1)	35 (2.3)	1,167 (76.5)	1,526 (100.0)	1	1,472	2,999
平均	46.80	47.19	47.44	48.81	48.36	36.40	48.56	48.45
標準偏差	10.09	8.27	10.67	10.91	10.71		10.31	10.51

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D1825##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査