

表 858 HDF希釈方法 透析前アルブミン濃度(g/dL)別 (IHDF 透析回数週3回)

透析前 アルブミン濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)				2 (100.0)	2 (100.0)		5	5
1.5~ (%)				1 (2.5)	33 (82.5)	40 (100.0)	10	12
2.0~ (%)	6 (15.0)		1 (2.5)	33 (82.5)	40 (100.0)		47	87
2.5~ (%)	39 (17.2)	5 (2.2)	2 (0.9)	181 (79.7)	227 (100.0)		228	455
3.0~ (%)	192 (15.5)	39 (3.2)	18 (1.5)	987 (79.9)	1,236 (100.0)	1	1,112	2,349
3.5~ (%)	450 (17.2)	92 (3.5)	48 (1.8)	2,028 (77.5)	2,618 (100.0)	6	2,440	5,064
4.0~ (%)	197 (21.6)	28 (3.1)	13 (1.4)	676 (74.0)	914 (100.0)	2	851	1,767
4.5~ (%)	7 (15.2)			39 (84.8)	46 (100.0)		48	94
5.0~ (%)							2	2
合計 (%)	891 (17.5)	164 (3.2)	82 (1.6)	3,946 (77.6)	5,083 (100.0)	9	4,743	9,835
記載なし (%)	6 (4.3)	5 (3.6)		128 (92.1)	139 (100.0)		83	222
総計 (%)	897 (17.2)	169 (3.2)	82 (1.6)	4,074 (78.0)	5,222 (100.0)	9	4,826	10,057
平均	3.65	3.62	3.63	3.61	3.62	3.73	3.61	3.62
標準偏差	0.40	0.32	0.37	0.39	0.39	0.21	0.42	0.40

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1826##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査