

表 859 HDF希釈方法 透析前CRP濃度(mg/dL)別 (IHDF 透析回数週3回)

透析前CRP濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	460 (20.1)	100 (4.4)	29 (1.3)	1,700 (74.3)	2,289 (100.0)	4	2,183	4,476
0.2～ (%)	184 (21.2)	24 (2.8)	13 (1.5)	647 (74.5)	868 (100.0)	3	866	1,737
0.5～ (%)	92 (18.8)	23 (4.7)	11 (2.2)	364 (74.3)	490 (100.0)	1	451	942
1.0～ (%)	47 (15.6)	8 (2.7)	6 (2.0)	240 (79.7)	301 (100.0)		293	594
2.0～ (%)	40 (20.5)	8 (4.1)	5 (2.6)	142 (72.8)	195 (100.0)		168	363
4.0～ (%)	10 (16.9)	1 (1.7)	4 (6.8)	44 (74.6)	59 (100.0)		49	108
6.0～ (%)	3 (16.7)			15 (83.3)	18 (100.0)		18	36
8.0～ (%)	2 (18.2)			9 (81.8)	11 (100.0)		12	23
10.0～ (%)	4 (26.7)			11 (73.3)	15 (100.0)		6	21
15.0～ (%)	1 (12.5)			7 (87.5)	8 (100.0)		4	12
合計 (%)	843 (19.8)	164 (3.9)	68 (1.6)	3,179 (74.7)	4,254 (100.0)	8	4,050	8,312
記載なし (%)	54 (5.6)	5 (0.5)	14 (1.4)	895 (92.5)	968 (100.0)	1	776	1,745
総計 (%)	897 (17.2)	169 (3.2)	82 (1.6)	4,074 (78.0)	5,222 (100.0)	9	4,826	10,057
平均	0.57	0.43	0.83	0.63	0.61	0.21	0.56	0.58
標準偏差	1.61	0.73	1.23	1.64	1.61	0.16	1.34	1.48

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1827##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査