

表 860 HDF希釈方法 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (IHDF 透析回数週3回)

透析前補正 カルシウム濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	7 (41.2)			10 (58.8)	17 (100.0)		8	25
7.0～ (%)	5 (20.0)	1 (4.0)		19 (76.0)	25 (100.0)		22	47
7.5～ (%)	27 (20.6)	6 (4.6)	1 (0.8)	97 (74.0)	131 (100.0)		94	225
8.0～ (%)	63 (15.8)	16 (4.0)	6 (1.5)	313 (78.6)	398 (100.0)	2	296	696
8.4～ (%)	28 (17.2)	7 (4.3)	2 (1.2)	126 (77.3)	163 (100.0)		146	309
8.5～ (%)	226 (16.6)	55 (4.0)	17 (1.2)	1,067 (78.2)	1,365 (100.0)	1	1,311	2,677
9.0～ (%)	245 (16.4)	50 (3.4)	21 (1.4)	1,174 (78.8)	1,490 (100.0)	3	1,451	2,944
9.5～ (%)	160 (18.3)	19 (2.2)	14 (1.6)	682 (77.9)	875 (100.0)	3	844	1,722
10.0～ (%)	20 (19.8)	1 (1.0)	5 (5.0)	75 (74.3)	101 (100.0)		100	201
10.1～ (%)	53 (18.0)	8 (2.7)	11 (3.7)	222 (75.5)	294 (100.0)		232	526
10.5～ (%)	37 (22.8)	1 (0.6)	5 (3.1)	119 (73.5)	162 (100.0)		116	278
11.0～ (%)	13 (33.3)			26 (66.7)	39 (100.0)		46	85
11.5～ (%)	5 (35.7)			9 (64.3)	14 (100.0)		14	28
12.0～ (%)	2 (28.6)			5 (71.4)	7 (100.0)		11	18
合計 (%)	891 (17.5)	164 (3.2)	82 (1.6)	3,944 (77.6)	5,081 (100.0)	9	4,691	9,781
記載なし (%)	6 (4.3)	5 (3.5)		130 (92.2)	141 (100.0)		135	276
総計 (%)	897 (17.2)	169 (3.2)	82 (1.6)	4,074 (78.0)	5,222 (100.0)	9	4,826	10,057
平均	9.17	8.95	9.34	9.13	9.13	8.96	9.16	9.14
標準偏差	0.82	0.61	0.72	0.71	0.73	0.61	0.69	0.71

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D1828##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査