

表 862 HDF希釈方法 PTH値(pg/mL)別 (IHDF 透析回数週3回) PTH測定法:intact-PTH

PTH値	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	32 (18.8)	5 (2.9)	8 (4.7)	125 (73.5)	170 (100.0)		210	380
20~ (%)	60 (22.1)	7 (2.6)	7 (2.6)	197 (72.7)	271 (100.0)		312	583
40~ (%)	62 (19.7)	10 (3.2)	4 (1.3)	239 (75.9)	315 (100.0)		335	650
60~ (%)	67 (20.1)	7 (2.1)	4 (1.2)	256 (76.6)	334 (100.0)	1	354	689
80~ (%)	80 (20.4)	15 (3.8)	7 (1.8)	291 (74.0)	393 (100.0)		381	774
100~ (%)	52 (14.9)	13 (3.7)	4 (1.1)	279 (80.2)	348 (100.0)	1	375	724
120~ (%)	61 (17.1)	19 (5.3)	9 (2.5)	267 (75.0)	356 (100.0)	1	326	683
140~ (%)	60 (18.1)	19 (5.7)	4 (1.2)	249 (75.0)	332 (100.0)	1	309	642
160~ (%)	56 (17.6)	12 (3.8)	5 (1.6)	245 (77.0)	318 (100.0)	2	272	592
180~ (%)	130 (19.5)	19 (2.9)	8 (1.2)	509 (76.4)	666 (100.0)	3	612	1,281
240~ (%)	1 (12.5)			7 (87.5)	8 (100.0)		4	12
241~ (%)	51 (13.5)	13 (3.4)	12 (3.2)	302 (79.9)	378 (100.0)		340	718
300~ (%)	31 (14.5)	4 (1.9)	5 (2.3)	174 (81.3)	214 (100.0)		177	391
360~ (%)	14 (12.6)	4 (3.6)	1 (0.9)	92 (82.9)	111 (100.0)		104	215
420~ (%)	8 (10.1)	3 (3.8)	2 (2.5)	66 (83.5)	79 (100.0)		57	136
480~ (%)	2 (14.3)	2 (14.3)		10 (71.4)	14 (100.0)		17	31
500~ (%)	1 (3.7)			26 (96.3)	27 (100.0)		24	51
540~ (%)	4 (12.5)	1 (3.1)		27 (84.4)	32 (100.0)		19	51
600~ (%)	4 (10.5)	1 (2.6)	2 (5.3)	31 (81.6)	38 (100.0)		41	79
800~ (%)	3 (12.0)			22 (88.0)	25 (100.0)		38	63
合計 (%)	779 (17.6)	154 (3.5)	82 (1.9)	3,414 (77.1)	4,429 (100.0)	9	4,307	8,745
記載なし (%)	12 (21.1)	3 (5.3)		42 (73.7)	57 (100.0)		138	195
総計 (%)	791 (17.6)	157 (3.5)	82 (1.8)	3,456 (77.0)	4,486 (100.0)	9	4,445	8,940
平均	151.21	163.97	166.27	174.34	169.76	159.67	165.24	167.53
標準偏差	115.77	114.01	144.19	144.66	139.26	52.66	164.00	151.90

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D1830##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査