

表 863 HDF希釈方法 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL)別 (IHDF 透析回数週3回)

透析前 ヘモグロビン濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
5未満 (%)				6 (100.0)	6 (100.0)		2	8
5~ (%)				1 (100.0)	1 (100.0)		3	4
6~ (%)		1 (9.1)	1 (9.1)	9 (81.8)	11 (100.0)		14	25
7~ (%)	11 (22.0)			39 (78.0)	50 (100.0)		45	95
8~ (%)	50 (20.2)	5 (2.0)		192 (77.7)	247 (100.0)		217	464
9~ (%)	152 (18.2)	21 (2.5)	10 (1.2)	654 (78.1)	837 (100.0)		763	1,600
10~ (%)	313 (17.5)	55 (3.1)	32 (1.8)	1,387 (77.6)	1,787 (100.0)	3	1,702	3,492
11~ (%)	247 (17.2)	61 (4.3)	18 (1.3)	1,108 (77.3)	1,434 (100.0)	4	1,322	2,760
12~ (%)	78 (14.7)	16 (3.0)	16 (3.0)	420 (79.2)	530 (100.0)	1	484	1,015
13~ (%)	22 (18.5)	4 (3.4)	3 (2.5)	90 (75.6)	119 (100.0)	1	126	246
14~ (%)	18 (30.0)	1 (1.7)	2 (3.3)	39 (65.0)	60 (100.0)		56	116
合計 (%)	891 (17.5)	164 (3.2)	82 (1.6)	3,945 (77.6)	5,082 (100.0)	9	4,734	9,825
記載なし (%)	6 (4.3)	5 (3.6)		129 (92.1)	140 (100.0)		92	232
総計 (%)	897 (17.2)	169 (3.2)	82 (1.6)	4,074 (78.0)	5,222 (100.0)	9	4,826	10,057
平均	10.74	10.93	11.07	10.75	10.76	11.40	10.77	10.77
標準偏差	1.24	1.13	1.33	1.23	1.23	0.83	1.22	1.23

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D1831##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2016年調査