

表 864 HDF希釈方法 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (IHDF 透析回数週3回)

総コレステロール 濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	27 (22.0)	6 (4.9)	1 (0.8)	89 (72.4)	123 (100.0)		154	277
100～ (%)	63 (14.4)	9 (2.1)	12 (2.7)	354 (80.8)	438 (100.0)		475	913
120～ (%)	153 (18.7)	15 (1.8)	15 (1.8)	635 (77.6)	818 (100.0)	1	868	1,687
140～ (%)	161 (16.3)	20 (2.0)	18 (1.8)	787 (79.8)	986 (100.0)	1	961	1,948
160～ (%)	167 (21.1)	13 (1.6)	13 (1.6)	598 (75.6)	791 (100.0)	2	735	1,528
180～ (%)	87 (16.6)	11 (2.1)	12 (2.3)	413 (79.0)	523 (100.0)	3	487	1,013
200～ (%)	61 (21.2)	7 (2.4)	4 (1.4)	216 (75.0)	288 (100.0)	1	265	554
220～ (%)	22 (22.2)	1 (1.0)	4 (4.0)	72 (72.7)	99 (100.0)		104	203
240～ (%)	19 (35.2)		1 (1.9)	34 (63.0)	54 (100.0)		47	101
260～ (%)	4 (14.3)		2 (7.1)	22 (78.6)	28 (100.0)		15	43
合計 (%)	764 (18.4)	82 (2.0)	82 (2.0)	3,220 (77.6)	4,148 (100.0)	8	4,111	8,267
記載なし (%)	133 (12.4)	87 (8.1)		854 (79.5)	1,074 (100.0)	1	715	1,790
総計 (%)	897 (17.2)	169 (3.2)	82 (1.6)	4,074 (78.0)	5,222 (100.0)	9	4,826	10,057
平均	158.69	151.12	160.35	156.01	156.49	174.63	154.10	155.32
標準偏差	36.35	36.66	40.25	34.49	35.02	26.62	34.61	34.83

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1832##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査