

表 868 1セッションあたりの置換液量(L) 原疾患別 (オフラインHDF 透析回数週3回 前希釈)

| 原疾患 | 1未満 | 1~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 合計 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 |
|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------|-------|-------|-------|
| 慢性系球体腎炎 (%) | | 19 (10.0) | 47 (24.7) | 69 (36.3) | 5 (2.6) | 50 (26.3) | 190 (100.0) | 12 | 202 | 13.48 | 8.63 |
| 慢性腎孟腎炎 (%) | | | 1 (33.3) | 1 (33.3) | | 1 (33.3) | 3 (100.0) | 1 | 4 | 15.33 | 12.86 |
| 急速進行性系球体腎炎 (%) | | 2 (50.0) | 2 (50.0) | | | | 4 (100.0) | 4 | 8.50 | 1.91 | |
| 妊娠腎/妊娠中毒症 (%) | | 1 (25.0) | | | 3 (75.0) | | 4 (100.0) | 4 | 24.00 | 12.00 | |
| その他の分類不能の腎炎 (%) | | 2 (100.0) | | | | | 2 (100.0) | 2 | 7.00 | 1.41 | |
| 多発性囊胞腎 (%) | | 4 (36.4) | 5 (45.5) | | 2 (18.2) | | 11 (100.0) | 11 | 12.18 | 6.95 | |
| 腎硬化症 (%) | 7 (21.2) | 12 (36.4) | 8 (24.2) | | 6 (18.2) | | 33 (100.0) | 1 | 34 | 10.61 | 8.12 |
| 悪性高血圧 (%) | | | 2 (100.0) | | | | 2 (100.0) | 2 | 10.00 | | |
| 糖尿病性腎症 (%) | 20 (12.6) | 48 (30.2) | 66 (41.5) | 4 (2.5) | 21 (13.2) | | 159 (100.0) | 6 | 165 | 10.97 | 7.14 |
| SLE腎炎 (%) | | 2 (66.7) | | | 1 (33.3) | | 3 (100.0) | 3 | 13.33 | 9.24 | |
| アミロイド腎 (%) | | 1 (50.0) | | | 1 (50.0) | | 2 (100.0) | 2 | 18.00 | 16.97 | |
| 痛風腎 (%) | 1 (50.0) | | | | 1 (50.0) | | 2 (100.0) | 2 | 14.00 | 14.14 | |
| 先天性代謝異常による腎不全 (%) | | | 1 (50.0) | | 1 (50.0) | | 2 (100.0) | 2 | 15.00 | 7.07 | |
| 腎・尿路結核 (%) | | | | | | | | | | | |
| 腎・尿路結石 (%) | | | | | | | | | | | |
| 腎・尿路腫瘍 (%) | | | | 1 (100.0) | | | 1 (100.0) | | 1 | 10.00 | |
| 閉塞性尿路障害 (%) | | | | | | | | | | | |
| 骨髄腫 (%) | | 1 (100.0) | | | | | 1 (100.0) | | 1 | 6.00 | |
| 腎形成不全 (%) | | | | | | | | | | | |
| 不明 (%) | 4 (10.3) | 21 (53.8) | 8 (20.5) | 1 (2.6) | 5 (12.8) | | 39 (100.0) | 5 | 44 | 10.21 | 7.01 |
| 再導入 (%) | | 1 (33.3) | 1 (33.3) | 1 (33.3) | | | 3 (100.0) | 3 | 10.67 | 5.03 | |
| その他 (%) | 2 (14.3) | 3 (21.4) | 7 (50.0) | 1 (7.1) | 1 (7.1) | | 14 (100.0) | 1 | 15 | 9.93 | 5.38 |
| 合計 (%) | 53 (11.2) | 146 (30.7) | 171 (36.0) | 12 (2.5) | 93 (19.6) | | 475 (100.0) | 26 | 501 | 12.04 | 7.98 |
| 記載なし (%) | | | | | | | | | | | |
| 総計 (%) | 53 (11.2) | 146 (30.7) | 171 (36.0) | 12 (2.5) | 93 (19.6) | | 475 (100.0) | 26 | 501 | 12.04 | 7.98 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1913##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査