

表 869 1セッションあたりの置換液量(L) 性別（オンラインHDF 透析回数週3回 前希釈）

性別	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性		63	561	1,131	583	4,286	5,380	12,197	2,405	3,253	735	250	142	30,986	672	31,658	40.77	15.27
(%)		(0.2)	(1.8)	(3.7)	(1.9)	(13.8)	(17.4)	(39.4)	(7.8)	(10.5)	(2.4)	(0.8)	(0.5)	(100.0)				
女性		50	419	704	421	2,722	3,441	5,885	999	1,349	298	108	46	16,442	357	16,799	38.22	15.16
(%)		(0.3)	(2.5)	(4.3)	(2.6)	(16.6)	(20.9)	(35.8)	(6.1)	(8.2)	(1.8)	(0.7)	(0.3)	(100.0)				
合計		113	980	1,835	1,004	7,008	8,821	18,082	3,404	4,602	1,033	358	188	47,428	1,029	48,457	39.88	15.28
(%)		(0.2)	(2.1)	(3.9)	(2.1)	(14.8)	(18.6)	(38.1)	(7.2)	(9.7)	(2.2)	(0.8)	(0.4)	(100.0)				
記載なし																		
(%)																		
総計		113	980	1,835	1,004	7,008	8,821	18,082	3,404	4,602	1,033	358	188	47,428	1,029	48,457	39.88	15.28
(%)		(0.2)	(2.1)	(3.9)	(2.1)	(14.8)	(18.6)	(38.1)	(7.2)	(9.7)	(2.2)	(0.8)	(0.4)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1920##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査