

表 872 1セッションあたりの置換液量(L) 原疾患別 (オンラインHDF 透析回数週3回 前希釀)

原疾患	1未満	1~	5~	10~	15~	20~	30~	40~	50~	60~	70~	80~	90~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性系球体腎炎		24 (0.2)	302 (1.9)	595 (3.8)	237 (1.5)	2,029 (12.9)	2,784 (17.8)	6,039 (38.5)	1,356 (8.6)	1,695 (10.8)	420 (2.7)	141 (0.9)	62 (0.4)	15,684 (100.0)	364	16,048	41.13	15.36
慢性腎盂腎炎		1 (0.2)	14 (3.1)	23 (5.1)	9 (2.0)	72 (16.0)	74 (16.4)	170 (37.7)	30 (6.7)	45 (10.0)	8 (1.8)	3 (0.7)	2 (0.4)	451 (100.0)	9	460	38.98	15.85
急速進行性系球体腎炎		4 (1.2)	9 (2.6)	11 (3.2)	10 (2.9)	54 (15.7)	60 (17.4)	125 (36.3)	21 (6.1)	33 (9.6)	13 (3.8)	3 (0.9)	1 (0.3)	344 (100.0)	9	353	39.63	16.33
妊娠腎/妊娠中毒症		1 (0.3)	2 (0.6)	16 (5.0)	2 (0.6)	47 (14.6)	63 (19.6)	113 (35.2)	30 (9.3)	29 (9.0)	11 (3.4)	7 (2.2)	321 (100.0)	7	328	41.30	15.56	
その他の分類不能の腎炎			4 (1.7)	9 (3.9)	6 (2.6)	28 (12.1)	32 (13.9)	95 (41.1)	24 (10.4)	24 (10.4)	6 (2.6)	1 (0.4)	2 (0.9)	231 (100.0)	5	236	41.81	15.44
多発性囊胞腎		1 (0.1)	34 (1.9)	65 (3.6)	34 (1.9)	251 (13.8)	337 (18.6)	748 (41.2)	137 (7.6)	162 (8.9)	28 (1.5)	9 (0.5)	8 (0.4)	1,814 (100.0)	43	1,857	40.17	14.59
腎硬化症		15 (0.4)	114 (2.8)	193 (4.8)	115 (2.9)	726 (18.1)	848 (21.1)	1,403 (35.0)	197 (4.9)	305 (7.6)	57 (1.4)	22 (0.5)	15 (0.4)	4,010 (100.0)	75	4,085	37.28	15.16
悪性高血圧		2 (0.5)	5 (1.2)	10 (2.5)	10 (2.5)	45 (11.2)	70 (17.4)	167 (41.5)	40 (10.0)	40 (10.0)	10 (2.5)	3 (0.7)	402 (100.0)	5	407	41.43	14.62	
糖尿病性腎症		46 (0.3)	334 (2.0)	665 (4.0)	375 (2.3)	2,701 (16.2)	3,132 (18.8)	6,380 (38.3)	1,028 (6.2)	1,518 (9.1)	318 (1.9)	105 (0.6)	60 (0.4)	16,662 (100.0)	391	17,053	39.16	15.11
SLE腎炎			8 (2.1)	12 (3.1)	4 (1.0)	57 (15.0)	64 (16.8)	153 (40.2)	38 (10.0)	39 (10.2)	2 (0.5)	2 (0.5)	2 (0.5)	381 (100.0)	8	389	40.21	14.36
アミロイド腎				3 (4.7)	3 (4.7)	12 (18.8)	12 (18.8)	22 (34.4)	9 (14.1)	3 (4.7)				64 (100.0)		64	37.19	12.79
痛風腎			2 (1.2)	7 (4.2)	2 (1.2)	16 (9.7)	32 (19.4)	66 (40.0)	16 (9.7)	19 (11.5)	4 (2.4)		1 (0.6)	165 (100.0)		165	41.85	14.51
先天性代謝異常による腎不全			1 (1.8)	2 (3.6)		12 (21.8)	9 (16.4)	24 (43.6)	1 (18.8)	5 (9.1)	1 (1.8)			55 (100.0)	1	56	38.71	13.73
腎・尿路結核		1 (2.9)		2 (5.9)		4 (11.8)	4 (11.8)	17 (50.0)	3 (8.8)	3 (8.8)				34 (100.0)		34	39.62	14.63
腎・尿路結石			3 (4.1)	2 (2.7)	1 (1.4)	12 (16.2)	19 (25.7)	28 (37.8)	2 (2.7)	4 (5.4)	2 (2.7)	1 (1.4)		74 (100.0)		74	38.15	15.24
腎・尿路腫瘍			3 (2.5)	1 (0.8)	4 (3.3)	12 (9.8)	23 (18.9)	55 (45.1)	6 (4.9)	14 (11.5)	1 (0.8)	1 (0.8)	2 (1.6)	122 (100.0)	5	127	41.66	14.99
閉塞性尿路障害			1 (1.0)	6 (5.7)	4 (3.8)	11 (10.5)	19 (18.1)	43 (41.0)	9 (8.6)	10 (9.5)				105 (100.0)	3	108	39.76	14.76
骨髄腫					2 (8.3)	3 (12.5)	3 (12.5)	10 (41.7)	2 (8.3)	4 (16.7)				24 (100.0)		24	42.63	13.98
腎形成不全					2 (1.7)	11 (9.5)	22 (19.0)	52 (44.8)	13 (11.2)	10 (8.6)	5 (4.3)	1 (0.9)		116 (100.0)		116	43.80	13.06
不明		13 (0.3)	110 (2.3)	153 (3.2)	162 (3.4)	681 (14.5)	910 (19.3)	1,752 (37.2)	304 (6.5)	465 (9.9)	100 (2.1)	41 (0.9)	20 (0.4)	4,711 (100.0)	65	4,776	39.57	15.47
再導入		1 (0.2)	9 (1.9)	18 (3.8)	3 (0.6)	43 (9.1)	77 (16.2)	196 (41.4)	49 (10.3)	56 (11.8)	15 (3.2)	4 (0.8)	3 (0.6)	474 (100.0)	8	482	43.15	15.30
その他		4 (0.3)	25 (2.1)	40 (3.4)	21 (1.8)	181 (15.3)	227 (19.2)	424 (35.8)	89 (7.5)	119 (10.1)	32 (2.7)	15 (1.3)	7 (0.6)	1,184 (100.0)	31	1,215	40.36	15.92
合計		113 (0.2)	980 (2.1)	1,835 (3.9)	1,004 (2.1)	7,008 (14.8)	8,821 (18.6)	18,082 (38.1)	3,404 (7.2)	4,602 (9.7)	1,033 (2.2)	358 (0.8)	188 (0.4)	47,428 (100.0)	1,029	48,457	39.88	15.28
記載なし																		
総計		113 (0.2)	980 (2.1)	1,835 (3.9)	1,004 (2.1)	7,008 (14.8)	8,821 (18.6)	18,082 (38.1)	3,404 (7.2)	4,602 (9.7)	1,033 (2.2)	358 (0.8)	188 (0.4)	47,428 (100.0)	1,029	48,457	39.88	15.28

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D1923##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査