

表 874 1セッションあたりの置換液量(L) 年齢(歳)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

年齢	1未満	1~	5~	10~	15~	20~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)											
15歳~ (%)		1 (14.3)	3 (42.9)	3 (42.9)			7 (100.0)		7	8.00	2.31
30歳~ (%)		7 (5.5)	58 (45.7)	62 (48.8)			127 (100.0)	2	129	8.51	1.87
45歳~ (%)		36 (5.6)	294 (45.4)	313 (48.3)	4 (0.6)	1 (0.2)	648 (100.0)	25	673	8.63	2.27
60歳~ (%)		124 (8.2)	790 (52.4)	590 (39.1)	3 (0.2)	2 (0.1)	1,509 (100.0)	64	1,573	8.08	2.22
75歳~ (%)		90 (11.4)	510 (64.4)	192 (24.2)			792 (100.0)	43	835	7.36	2.14
90歳~ (%)		5 (17.2)	21 (72.4)	3 (10.3)			29 (100.0)	4	33	6.55	1.76
合計 (%)		263 (8.5)	1,676 (53.9)	1,163 (37.4)	7 (0.2)	3 (0.1)	3,112 (100.0)	138	3,250	8.01	2.24
不明 (%)											
記載なし (%)											
総計 (%)		263 (8.5)	1,676 (53.9)	1,163 (37.4)	7 (0.2)	3 (0.1)	3,112 (100.0)	138	3,250	8.01	2.24
平均		69.78	68.10	63.61	57.43	60.33	66.53	69.46	66.66		
標準偏差		11.65	11.97	11.22	9.13	12.42	11.89	11.40	11.89		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1931##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査