

表 877 1セッションあたりの置換液量(L) 医療機関別 (オフラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

医療機関	1未満	1~	5~	10~	15~	20~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学 (%)			9 (75.0)	3 (25.0)			12 (100.0)	1	13	7.83	1.59
私立大学 (%)		2 (18.2)	7 (63.6)	2 (18.2)			11 (100.0)		11	6.73	2.05
国立病院機構等 (%)			9 (81.8)	2 (18.2)			11 (100.0)		11	8.36	0.81
県市町村立・国保 (%)	18 (7.5)	141 (59.0)	79 (33.1)	1 (0.4)			239 (100.0)	15	254	8.15	2.11
JCHO(旧社会保険)等 (%)	1 (12.5)	5 (62.5)	2 (25.0)				8 (100.0)	1	9	8.25	2.25
厚生連等 (%)	19 (17.9)	58 (54.7)	29 (27.4)				106 (100.0)		106	7.30	2.29
その他公的 (%)	3 (2.9)	64 (62.1)	36 (35.0)				103 (100.0)	1	104	8.44	1.80
私立総合 (%)	8 (7.8)	68 (66.0)	27 (26.2)				103 (100.0)	8	111	7.71	1.84
私立 (%)	120 (12.6)	476 (49.9)	350 (36.7)	4 (0.4)	3 (0.3)		953 (100.0)	45	998	7.80	2.61
私立診療所 (%)	92 (5.9)	839 (53.6)	633 (40.4)	2 (0.1)			1,566 (100.0)	67	1,633	8.17	2.05
総計 (%)	263 (8.5)	1,676 (53.9)	1,163 (37.4)	7 (0.2)	3 (0.1)		3,112 (100.0)	138	3,250	8.01	2.24

数値下のっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1934##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査