

表 881 1セッションあたりの置換液量(L) 原疾患別 (オンラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

| 原疾患 | 1未満 | 1~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 合計 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 |
|-------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|-------------|---------------|------|-------|-------|------|
| 慢性系球体腎炎 (%) | | 32 (3.9) | 272 (33.0) | 401 (48.7) | 81 (9.8) | 37 (4.5) | 823 (100.0) | 16 | 839 | 10.58 | 3.98 |
| 慢性腎孟腎炎 (%) | | 7 (38.9) | 8 (44.4) | 2 (11.1) | 1 (5.6) | 18 (100.0) | | 18 | 10.39 | 3.50 | |
| 急速進行性系球体腎炎 (%) | | 3 (30.0) | 4 (40.0) | 1 (10.0) | 2 (20.0) | 10 (100.0) | 1 | 11 | 12.60 | 5.78 | |
| 妊娠腎/妊娠中毒症 (%) | | 6 (30.0) | 14 (70.0) | | | (100.0) | | 20 | 10.00 | 2.45 | |
| その他の分類不能の腎炎 (%) | 1 (5.9) | 7 (41.2) | 8 (47.1) | 1 (5.9) | | 17 (100.0) | | 17 | 9.18 | 2.70 | |
| 多発性囊胞腎 (%) | 3 (3.5) | 34 (40.0) | 34 (40.0) | 8 (9.4) | 6 (7.1) | 85 (100.0) | 1 | 86 | 10.84 | 4.41 | |
| 腎硬化症 (%) | 9 (5.1) | 91 (52.0) | 58 (33.1) | 14 (8.0) | 3 (1.7) | 175 (100.0) | 2 | 177 | 9.49 | 3.64 | |
| 悪性高血圧 (%) | 2 (14.3) | 5 (35.7) | 6 (42.9) | | 1 (7.1) | 14 (100.0) | | 14 | 9.14 | 4.35 | |
| 糖尿病性腎症 (%) | 28 (3.8) | 336 (46.0) | 288 (39.5) | 47 (6.4) | 31 (4.2) | 730 (100.0) | 3 | 733 | 9.97 | 3.89 | |
| SLE腎炎 (%) | | 4 (26.7) | 7 (46.7) | 3 (20.0) | 1 (6.7) | 15 (100.0) | | 15 | 11.67 | 4.40 | |
| アミロイド腎 (%) | | 1 (50.0) | | | 1 (50.0) | (100.0) | | 2 | 14.00 | 8.49 | |
| 痛風腎 (%) | 1 (14.3) | | 6 (85.7) | | | 7 (100.0) | | 7 | 9.14 | 2.27 | |
| 先天性代謝異常による腎不全 (%) | | 2 (40.0) | 3 (60.0) | | | 5 (100.0) | | 5 | 9.80 | 1.48 | |
| 腎・尿路結核 (%) | | 1 (100.0) | | | | 1 (100.0) | | 1 | 7.00 | | |
| 腎・尿路結石 (%) | | 2 (50.0) | 1 (25.0) | 1 (25.0) | | 4 (100.0) | | 4 | 10.75 | 3.59 | |
| 腎・尿路腫瘍 (%) | 1 (10.0) | 5 (50.0) | 3 (30.0) | | 1 (10.0) | (100.0) | | 10 | 9.40 | 4.40 | |
| 閉塞性尿路障害 (%) | | | 2 (100.0) | | | 2 (100.0) | | 2 | 13.00 | | |
| 骨髄腫 (%) | | | 1 (100.0) | | | 1 (100.0) | | 1 | 10.00 | | |
| 腎形成不全 (%) | | 1 (16.7) | 5 (83.3) | | | 6 (100.0) | | 6 | 9.83 | 2.56 | |
| 不明 (%) | 15 (8.2) | 75 (41.0) | 72 (39.3) | 16 (8.7) | 5 (2.7) | 183 (100.0) | 2 | 185 | 9.72 | 4.20 | |
| 再導入 (%) | | 6 (31.6) | 7 (36.8) | 5 (26.3) | 1 (5.3) | 19 (100.0) | | 19 | 12.74 | 4.56 | |
| その他 (%) | 1 (1.9) | 29 (53.7) | 19 (35.2) | 3 (5.6) | 2 (3.7) | 54 (100.0) | 1 | 55 | 9.72 | 3.41 | |
| 合計 (%) | | 93 (4.2) | 887 (40.3) | 947 (43.0) | 182 (8.3) | 92 (4.2) | 2,201 (100.0) | 26 | 2,227 | 10.21 | 3.96 |
| 記載なし (%) | | | | | | | | | | | |
| 総計 (%) | | 93 (4.2) | 887 (40.3) | 947 (43.0) | 182 (8.3) | 92 (4.2) | 2,201 (100.0) | 26 | 2,227 | 10.21 | 3.96 |

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1943##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査