

表 883 1セッションあたりの置換液量(L) 性別 (IHDF 透析回数週3回)

| 性別 | 0.2未満 | 0.2~ | 0.8~ | 1.2~ | 1.6~ | 2.0~ | 2.4~ | 合計 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 |
|-------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------------|-------|--------|------|------|
| 男性 (%) | | 405 (14.1) | 1,045 (36.3) | 1,138 (39.5) | 119 (4.1) | 129 (4.5) | 45 (1.6) | 2,881 (100.0) | 3,469 | 6,350 | 1.18 | 0.50 |
| 女性 (%) | | 264 (16.2) | 610 (37.5) | 617 (37.9) | 61 (3.8) | 61 (3.8) | 13 (0.8) | 1,626 (100.0) | 2,081 | 3,707 | 1.14 | 0.45 |
| 合計 (%) | | 669 (14.8) | 1,655 (36.7) | 1,755 (38.9) | 180 (4.0) | 190 (4.2) | 58 (1.3) | 4,507 (100.0) | 5,550 | 10,057 | 1.17 | 0.48 |
| 記載なし (%) | | | | | | | | | | | | |
| 総計 (%) | | 669 (14.8) | 1,655 (36.7) | 1,755 (38.9) | 180 (4.0) | 190 (4.2) | 58 (1.3) | 4,507 (100.0) | 5,550 | 10,057 | 1.17 | 0.48 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1950##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査