

表 884 1セッションあたりの置換液量(L) 年齢(歳)別 (IHDF 透析回数週3回)

年齢	0.2未満	0.2~	0.8~	1.2~	1.6~	2.0~	2.4~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)												
15歳~ (%)		4 (25.0)	5 (31.3)	6 (37.5)		1 (6.3)		16 (100.0)	16	32	1.02	0.52
30歳~ (%)		32 (16.2)	70 (35.4)	70 (35.4)	12 (6.1)	10 (5.1)	4 (2.0)	198 (100.0)	166	364	1.19	0.58
45歳~ (%)		124 (15.8)	273 (34.9)	302 (38.6)	39 (5.0)	38 (4.9)	7 (0.9)	783 (100.0)	788	1,571	1.16	0.48
60歳~ (%)		275 (14.1)	703 (36.1)	764 (39.2)	74 (3.8)	93 (4.8)	38 (2.0)	1,947 (100.0)	2,526	4,473	1.19	0.51
75歳~ (%)		221 (15.0)	566 (38.3)	583 (39.5)	51 (3.5)	46 (3.1)	9 (0.6)	1,476 (100.0)	1,928	3,404	1.14	0.44
90歳~ (%)		13 (14.9)	38 (43.7)	30 (34.5)	4 (4.6)	2 (2.3)		87 (100.0)	126	213	1.10	0.35
合計 (%)		669 (14.8)	1,655 (36.7)	1,755 (38.9)	180 (4.0)	190 (4.2)	58 (1.3)	4,507 (100.0)	5,550	10,057	1.17	0.48
不明 (%)												
記載なし (%)												
総計 (%)		669 (14.8)	1,655 (36.7)	1,755 (38.9)	180 (4.0)	190 (4.2)	58 (1.3)	4,507 (100.0)	5,550	10,057	1.17	0.48
平均		68.32	68.96	68.61	66.63	66.70	65.43	68.49	69.81	69.22		
標準偏差		13.28	12.61	12.16	13.28	11.95	11.11	12.53	11.82	12.16		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1951##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査