

表 887 1セッションあたりの置換液量(L) 医療機関別 (IHDF 透析回数週3回)

医療機関	0.2未満	0.2～	0.8～	1.2～	1.6～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学 (%)												
私立大学 (%)									2	2		
国立病院機構等 (%)												
県市町村立・国保 (%)			13 (22.0)	22 (37.3)	5 (8.5)	18 (30.5)	1 (1.7)	59 (100.0)	104	163	1.53	0.43
JCHO(旧社会保険)等 (%)									24	24		
厚生連等 (%)			1 (7.1)	11 (78.6)		2 (14.3)		14 (100.0)	47	61	1.46	0.25
その他公的 (%)			1 (100.0)					1 (100.0)	55	56	1.00	
私立総合 (%)		33 (73.3)				12 (26.7)		45 (100.0)	118	163	1.00	0.61
私立 (%)		71 (7.4)	405 (42.4)	345 (36.1)	67 (7.0)	58 (6.1)	9 (0.9)	955 (100.0)	1,904	2,859	1.23	0.42
私立診療所 (%)		565 (16.5)	1,235 (36.0)	1,377 (40.1)	108 (3.1)	100 (2.9)	48 (1.4)	3,433 (100.0)	3,296	6,729	1.15	0.50
総計 (%)		669 (14.8)	1,655 (36.7)	1,755 (38.9)	180 (4.0)	190 (4.2)	58 (1.3)	4,507 (100.0)	5,550	10,057	1.17	0.48

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1954##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査