

表 889 身長(cm) 治療方法(新分類)別(透析患者全体)

治療方法 (新分類)	130未満	130~	135~	140~	145~	150~	155~	160~	165~	170~	175~	180~	185~	190~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差		
施設血液透析	195 (%)	551 (0.1)	2,211 (0.3)	8,089 (1.1)	18,125 (4.0)	28,609 (8.9)	33,373 (14.0)	41,087 (16.3)	37,237 (20.1)	23,646 (18.2)	8,731 (11.6)	2,360 (4.3)	367 (1.2)	56 (0.2)	204,637 (0.0)	29,067 (100.0)	233,704 (100.0)	160.10	9.59		
Off-line HDF	1 (%)	6 (0.0)	29 (0.1)	135 (0.7)	366 (3.2)	607 (8.7)	716 (14.4)	807 (17.0)	722 (19.1)	535 (17.1)	226 (12.7)	57 (5.4)	9 (1.4)	1 (0.2)	4,217 (0.0)	420 (100.0)	4,637 (100.0)	160.61	9.53		
On-line HDF	43 (%)	88 (0.1)	380 (0.2)	1,450 (0.7)	3,853 (2.8)	6,849 (7.4)	8,413 (13.1)	10,252 (16.1)	9,983 (19.6)	7,290 (19.0)	2,842 (13.9)	809 (5.4)	145 (1.5)	18 (0.3)	52,415 (0.0)	6,701 (100.0)	59,116 (100.0)	161.39	9.44		
Push/Pull HDF	1 (%)	1 (1.6)	2 (0.2)	4 (0.7)	12 (2.8)	6 (6.6)	10 (19.7)	9 (9.8)	9 (16.4)	5 (14.8)	5 (14.8)	3 (8.2)	3 (4.9)	61 (0.0)	5 (100.0)	66 (100.0)	161.31	11.02			
バイオフィルトレーション	1 (%)	5 (0.5)	17 (2.3)	18 (7.7)	39 (8.1)	34 (17.6)	36 (15.3)	34 (16.2)	26 (15.3)	10 (11.7)	10 (4.5)	2 (0.9)	2 (0.9)	222 (0.0)	30 (100.0)	252 (100.0)	158.64	10.51			
IHDF	8 (%)	22 (0.1)	110 (0.2)	413 (1.2)	961 (4.3)	1,397 (10.1)	1,574 (14.6)	1,873 (14.6)	1,656 (16.5)	1,069 (19.6)	353 (17.4)	87 (11.2)	16 (3.7)	2 (0.9)	2 (0.2)	2 (0.0)	9,541 (100.0)	1,187 (100.0)	10,728 (100.0)	159.56	9.55
血液濾過					2 (%)	1 (22.2)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)	2 (22.2)			1 (11.1)	9 (11.1)	10 (100.0)	19 (100.0)	163.22	15.27		
血液吸着透析 (リクセル等使用)			1 (%)	8 (0.1)	44 (0.6)	149 (3.4)	251 (11.6)	266 (19.6)	231 (20.8)	185 (18.1)	102 (14.5)	37 (8.0)	3 (2.9)	2 (0.2)	2 (0.2)	1 (0.0)	1,279 (100.0)	76 (100.0)	1,355 (100.0)	158.24	8.69
在宅血液透析					1 (%)	10 (0.2)	32 (2.1)	50 (6.6)	87 (10.3)	101 (18.0)	115 (20.9)	69 (23.8)	15 (14.3)	3 (3.1)	3 (0.6)	1 (0.2)	484 (100.0)	133 (100.0)	617 (100.0)	166.71	8.21
腹膜透析 (CAPD)	4 (%)	6 (0.1)	42 (0.2)	133 (1.1)	296 (3.5)	509 (7.7)	669 (13.3)	753 (17.5)	725 (19.7)	445 (18.9)	197 (11.6)	44 (5.1)	3 (1.1)	1 (0.1)	3 (0.0)	3,827 (100.0)	1,146 (100.0)	4,973 (100.0)	160.65	9.44	
腹膜透析 (APD)	48 (%)	8 (2.4)	25 (0.4)	49 (1.2)	111 (2.4)	213 (5.5)	303 (10.5)	420 (14.9)	405 (20.7)	282 (19.9)	125 (13.9)	35 (6.2)	6 (1.7)	1 (0.3)	1 (0.0)	2,031 (100.0)	606 (100.0)	2,637 (100.0)	160.56	13.93	
腹膜透析 (CCPD)	10 (%)	1 (1.2)	2 (0.1)	12 (0.2)	26 (1.5)	80 (3.2)	86 (10.0)	165 (10.7)	190 (20.6)	148 (23.7)	60 (18.5)	20 (7.5)	1 (2.5)	1 (0.1)	1 (0.1)	802 (100.0)	203 (100.0)	1,005 (100.0)	163.47	11.76	
合計	310 (%)	684 (0.1)	2,812 (0.2)	10,345 (1.0)	23,921 (3.7)	38,599 (8.6)	45,491 (13.8)	55,722 (16.3)	51,248 (19.9)	33,667 (18.3)	12,657 (12.0)	3,435 (4.5)	552 (1.2)	82 (0.2)	279,525 (0.0)	39,584 (100.0)	319,109 (100.0)	160.36	9.62		
記載なし (%)																					
総計	310 (%)	684 (0.1)	2,812 (0.2)	10,345 (1.0)	23,921 (3.7)	38,599 (8.6)	45,491 (13.8)	55,722 (16.3)	51,248 (19.9)	33,667 (18.3)	12,657 (12.0)	3,435 (4.5)	552 (1.2)	82 (0.2)	279,525 (0.0)	39,584 (100.0)	319,109 (100.0)	160.36	9.62		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

\*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

#ID2011#

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査