

表 899 身長(cm) 原疾患別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

原疾患	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	38 (0.1)	131 (0.2)	611 (1.1)	2,153 (4.0)	5,031 (9.4)	8,109 (15.2)	9,077 (17.0)	10,415 (19.5)	9,304 (17.4)	5,920 (11.1)	2,040 (3.8)	501 (0.9)	71 (0.1)	8 (0.0)	53,409 (100.0)	3,763 (100.0)	57,172 (100.0)	159.65	9.46
慢性腎盂腎炎 (%)		7 (0.4)	20 (1.1)	95 (5.5)	230 (13.2)	327 (18.8)	320 (18.4)	294 (16.9)	239 (13.7)	136 (7.8)	55 (3.2)	19 (1.1)		1 (0.1)	1,743 (100.0)	125 (100.0)	1,868 (100.0)	157.80	9.56
急速進行性糸球体腎炎 (%)		4 (0.3)	28 (1.8)	98 (6.3)	186 (11.9)	257 (16.4)	280 (17.9)	290 (18.5)	201 (12.8)	160 (10.2)	48 (3.1)	13 (0.8)	3 (0.2)		1,568 (100.0)	119 (100.0)	1,687 (100.0)	158.06	9.75
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	1 (0.1)	1 (0.1)	9 (1.1)	62 (7.5)	174 (21.0)	249 (30.0)	217 (26.1)	89 (10.7)	25 (3.0)	2 (0.2)	1 (0.1)				830 (100.0)	19 (100.0)	849 (100.0)	152.79	6.31
その他の分類不能の腎炎 (%)		1 (0.1)	14 (1.7)	32 (3.8)	89 (10.5)	122 (14.5)	144 (17.1)	137 (16.2)	144 (17.1)	106 (12.6)	43 (5.1)	10 (1.2)	2 (0.2)		844 (100.0)	58 (100.0)	902 (100.0)	159.91	9.88
多発性嚢胞腎 (%)	2 (0.0)	7 (0.1)	31 (0.4)	158 (2.2)	529 (7.5)	1,067 (15.1)	1,241 (17.5)	1,224 (17.3)	1,157 (16.3)	977 (13.8)	496 (7.0)	154 (2.2)	31 (0.4)	5 (0.1)	7,079 (100.0)	469 (100.0)	7,548 (100.0)	161.60	9.67
腎硬化症 (%)	16 (0.1)	109 (0.6)	366 (1.8)	1,191 (6.0)	2,104 (10.6)	2,830 (14.3)	3,459 (17.5)	4,076 (20.6)	3,272 (16.5)	1,738 (8.8)	514 (2.6)	118 (0.6)	15 (0.1)	1 (0.0)	19,809 (100.0)	1,709 (100.0)	21,518 (100.0)	158.32	9.58
悪性高血圧 (%)		7 (0.4)	17 (1.0)	60 (3.6)	137 (8.2)	198 (11.9)	249 (15.0)	324 (19.5)	319 (19.2)	226 (13.6)	96 (5.8)	25 (1.5)	4 (0.2)	1 (0.1)	1,663 (100.0)	114 (100.0)	1,777 (100.0)	161.13	9.80
糖尿病性腎症 (%)	75 (0.1)	126 (0.2)	554 (0.7)	2,373 (3.0)	5,669 (7.3)	9,511 (12.2)	11,769 (15.1)	16,380 (21.0)	15,873 (20.4)	10,342 (13.3)	3,950 (5.1)	1,129 (1.4)	174 (0.2)	30 (0.0)	77,955 (100.0)	6,513 (100.0)	84,468 (100.0)	161.35	9.39
SLE腎炎 (%)		5 (0.4)	19 (1.5)	61 (4.8)	159 (12.5)	300 (23.6)	272 (21.4)	207 (16.3)	142 (11.2)	61 (4.8)	33 (2.6)	9 (0.7)	2 (0.2)		1,270 (100.0)	100 (100.0)	1,370 (100.0)	156.67	8.83
アミロイド腎 (%)	1 (0.4)	1 (0.4)	5 (2.0)	25 (9.8)	33 (12.9)	52 (20.3)	41 (16.0)	33 (12.9)	34 (13.3)	29 (11.3)					256 (100.0)	24 (100.0)	280 (100.0)	156.40	10.23
痛風腎 (%)			1 (0.2)	9 (1.4)	22 (3.3)	56 (8.5)	102 (15.5)	169 (25.7)	170 (25.9)	91 (13.9)	28 (4.3)	7 (1.1)	2 (0.3)		657 (100.0)	43 (100.0)	700 (100.0)	162.97	7.60
先天性代謝異常による腎不全 (%)	1 (0.6)	2 (1.3)	3 (1.9)	2 (1.3)	19 (11.9)	21 (13.1)	34 (21.3)	26 (16.3)	25 (15.6)	15 (9.4)	10 (6.3)	2 (1.3)			160 (100.0)	9 (100.0)	169 (100.0)	159.50	10.30
腎・尿路結核 (%)	1 (1.0)		2 (2.0)	3 (3.0)	14 (14.1)	21 (21.2)	21 (21.2)	19 (19.2)	11 (11.1)	6 (6.1)	1 (1.0)				99 (100.0)	7 (100.0)	106 (100.0)	156.66	8.66
腎・尿路結石 (%)	2 (0.6)	3 (0.8)	5 (1.4)	17 (4.7)	31 (8.6)	49 (13.5)	79 (21.8)	81 (22.4)	51 (14.1)	35 (9.7)	9 (2.5)				362 (100.0)	22 (100.0)	384 (100.0)	158.50	9.24
腎・尿路腫瘍 (%)	1 (0.2)	2 (0.3)	7 (1.1)	14 (2.3)	47 (7.7)	59 (9.7)	92 (15.1)	147 (24.1)	148 (24.3)	59 (9.7)	30 (4.9)	3 (0.5)			609 (100.0)	35 (100.0)	644 (100.0)	161.06	8.96
閉塞性尿路障害 (%)	1 (0.2)	4 (0.9)	4 (0.9)	21 (4.8)	45 (10.3)	61 (14.0)	82 (18.9)	74 (17.0)	79 (18.2)	47 (10.8)	13 (3.0)	3 (0.7)		1 (0.2)	435 (100.0)	30 (100.0)	465 (100.0)	159.00	9.91
骨髄腫 (%)	1 (0.5)	1 (0.5)	1 (0.5)	14 (7.2)	16 (8.2)	36 (18.6)	41 (21.1)	34 (17.5)	24 (12.4)	20 (10.3)	5 (2.6)	1 (0.5)			194 (100.0)	19 (100.0)	213 (100.0)	158.00	9.46
腎形成不全 (%)	6 (1.7)	7 (2.0)	12 (3.5)	24 (6.9)	36 (10.4)	32 (9.2)	52 (15.0)	75 (21.7)	56 (16.2)	29 (8.4)	12 (3.5)	5 (1.4)			346 (100.0)	22 (100.0)	368 (100.0)	157.47	11.64
不明 (%)	29 (0.2)	66 (0.4)	296 (1.6)	943 (5.2)	1,973 (10.8)	2,807 (15.4)	3,038 (16.6)	3,608 (19.7)	2,970 (16.2)	1,754 (9.6)	607 (3.3)	163 (0.9)	29 (0.2)	3 (0.0)	18,286 (100.0)	2,192 (100.0)	20,478 (100.0)	158.71	9.76
再導入 (%)	3 (0.3)	3 (0.3)	8 (0.7)	19 (1.7)	93 (8.4)	129 (11.6)	184 (16.6)	208 (18.8)	220 (19.9)	159 (14.4)	61 (5.5)	18 (1.6)	2 (0.2)	1 (0.1)	1,108 (100.0)	56 (100.0)	1,164 (100.0)	161.58	9.52
その他 (%)	8 (0.2)	21 (0.4)	66 (1.4)	258 (5.3)	471 (9.7)	677 (14.0)	769 (15.8)	911 (18.8)	856 (17.6)	550 (11.3)	195 (4.0)	58 (1.2)	12 (0.2)	1 (0.0)	4,853 (100.0)	553 (100.0)	5,406 (100.0)	159.55	10.01
合計 (%)	186 (0.1)	508 (0.3)	2,079 (1.1)	7,632 (3.9)	17,108 (8.8)	26,970 (13.9)	31,563 (16.3)	38,821 (20.1)	35,320 (18.2)	22,462 (11.6)	8,247 (4.3)	2,239 (1.2)	348 (0.2)	52 (0.0)	193,535 (100.0)	16,001 (100.0)	209,536 (100.0)	160.13	9.58
記載なし (%)																			
総計 (%)	186 (0.1)	508 (0.3)	2,079 (1.1)	7,632 (3.9)	17,108 (8.8)	26,970 (13.9)	31,563 (16.3)	38,821 (20.1)	35,320 (18.2)	22,462 (11.6)	8,247 (4.3)	2,239 (1.2)	348 (0.2)	52 (0.0)	193,535 (100.0)	16,001 (100.0)	209,536 (100.0)	160.13	9.58

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

#D2023##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査