

表 904 身長(cm) 原疾患別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

原疾患	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	9 (0.0)	46 (0.2)	119 (0.6)	589 (2.8)	1,724 (8.2)	3,108 (14.7)	3,653 (17.3)	3,999 (18.9)	3,824 (18.1)	2,722 (12.9)	1,025 (4.9)	258 (1.2)	41 (0.2)	2 (0.0)	21,119 (100.0)	1,269	22,388	160.76	9.30
慢性腎盂腎炎 (%)	2 (0.3)	3 (0.5)	11 (1.9)	34 (5.8)	72 (12.3)	97 (16.6)	102 (17.4)	105 (17.9)	78 (13.3)	52 (8.9)	24 (4.1)	5 (0.9)			585 (100.0)	42	627	158.00	10.00
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1 (0.2)		4 (0.9)	22 (4.9)	40 (8.9)	81 (18.0)	79 (17.5)	78 (17.3)	73 (16.2)	47 (10.4)	17 (3.8)	7 (1.6)	2 (0.4)		451 (100.0)	33	484	159.48	9.80
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)		1 (0.2)	7 (1.6)	32 (7.3)	75 (17.2)	145 (33.3)	116 (26.6)	47 (10.8)	11 (2.5)	2 (0.5)					436 (100.0)	23	459	152.88	6.11
その他の分類不能の腎炎 (%)			4 (1.2)	17 (5.1)	16 (4.8)	46 (13.7)	53 (15.8)	56 (16.7)	74 (22.0)	49 (14.6)	18 (5.4)	3 (0.9)			336 (100.0)	19	355	161.16	9.41
多発性嚢胞腎 (%)	1 (0.0)	1 (0.0)	14 (0.6)	36 (1.5)	149 (6.2)	292 (12.1)	435 (18.0)	406 (16.8)	410 (17.0)	400 (16.5)	198 (8.2)	58 (2.4)	16 (0.7)	1 (0.0)	2,417 (100.0)	152	2,569	162.76	9.62
腎硬化症 (%)	6 (0.1)	17 (0.3)	99 (1.8)	261 (4.8)	540 (9.9)	792 (14.5)	907 (16.6)	1,125 (20.6)	926 (17.0)	546 (10.0)	185 (3.4)	48 (0.9)	8 (0.1)	2 (0.0)	5,462 (100.0)	434	5,896	159.13	9.65
悪性高血圧 (%)			6 (1.1)	7 (1.3)	33 (6.2)	50 (9.4)	66 (12.4)	109 (20.5)	113 (21.2)	89 (16.7)	40 (7.5)	16 (3.0)	2 (0.4)	1 (0.2)	532 (100.0)	23	555	163.39	9.45
糖尿病性腎症 (%)	19 (0.1)	18 (0.1)	127 (0.6)	578 (2.5)	1,445 (6.3)	2,538 (11.1)	3,319 (14.5)	4,676 (20.5)	4,703 (20.6)	3,563 (15.6)	1,371 (6.0)	397 (1.7)	74 (0.3)	14 (0.1)	22,842 (100.0)	1,674	24,516	162.29	9.31
SLE腎炎 (%)	1 (0.2)		7 (1.4)	20 (4.0)	61 (12.1)	109 (21.5)	114 (22.5)	87 (17.2)	52 (10.3)	39 (7.7)	9 (1.8)	7 (1.4)			506 (100.0)	31	537	157.30	8.79
アミロイド腎 (%)			2 (2.2)	3 (3.3)	10 (11.0)	18 (19.8)	21 (23.1)	20 (22.0)	9 (9.9)	6 (6.6)	2 (2.2)				91 (100.0)	7	98	157.36	8.35
痛風腎 (%)				4 (1.8)	7 (3.2)	11 (5.0)	31 (14.2)	50 (22.8)	58 (26.5)	43 (19.6)	13 (5.9)	1 (0.5)	1 (0.5)		219 (100.0)	8	227	164.26	7.76
先天性代謝異常による腎不全 (%)		1 (1.5)	7 (10.8)	2 (3.1)	5 (7.7)	7 (10.8)	10 (15.4)	13 (20.0)	12 (18.5)	5 (7.7)	2 (3.1)		1 (1.5)		65 (100.0)	8	73	157.62	11.56
腎・尿路結核 (%)			2 (4.9)	2 (4.9)	10 (24.4)	6 (14.6)	5 (12.2)	9 (22.0)	6 (14.6)	1 (2.4)					41 (100.0)	3	44	155.02	8.79
腎・尿路結石 (%)	1 (1.0)		1 (1.0)	3 (2.9)	9 (8.7)	16 (15.4)	19 (18.3)	19 (18.3)	15 (14.4)	10 (9.6)	9 (8.7)	2 (1.9)			104 (100.0)	9	113	160.42	10.15
腎・尿路腫瘍 (%)			1 (0.6)	4 (2.3)	6 (3.4)	16 (9.0)	24 (13.6)	38 (21.5)	45 (25.4)	33 (18.6)	8 (4.5)	2 (1.1)			177 (100.0)	13	190	163.23	8.35
閉塞性尿路障害 (%)	1 (0.7)		1 (0.7)	9 (6.1)	18 (12.2)	24 (16.3)	19 (12.9)	28 (19.0)	21 (14.3)	17 (11.6)	6 (4.1)	1 (0.7)	2 (1.4)		147 (100.0)	4	151	159.01	10.68
骨髄腫 (%)				1 (3.0)	3 (9.1)		10 (30.3)	8 (24.2)	5 (15.2)	4 (12.1)	2 (6.1)				33 (100.0)	4	37	161.30	8.77
腎形成不全 (%)	1 (0.6)	2 (1.2)	9 (5.4)	13 (7.8)	15 (9.0)	19 (11.4)	29 (17.4)	25 (15.0)	20 (12.0)	28 (16.8)	3 (1.8)	3 (1.8)			167 (100.0)	4	171	158.11	11.71
不明 (%)	5 (0.1)	18 (0.3)	68 (1.1)	243 (4.0)	560 (9.2)	866 (14.3)	997 (16.4)	1,166 (19.2)	1,116 (18.4)	673 (11.1)	268 (4.4)	70 (1.2)	11 (0.2)		6,061 (100.0)	470	6,531	159.99	9.62
再導入 (%)		2 (0.3)	3 (0.5)	14 (2.3)	41 (6.8)	74 (12.3)	81 (13.4)	133 (22.1)	130 (21.6)	79 (13.1)	34 (5.6)	11 (1.8)	1 (0.2)		603 (100.0)	30	633	161.95	9.15
その他 (%)	2 (0.1)	3 (0.2)	12 (0.8)	53 (3.4)	145 (9.2)	235 (15.0)	242 (15.4)	307 (19.6)	276 (17.6)	191 (12.2)	78 (5.0)	23 (1.5)	3 (0.2)		1,570 (100.0)	150	1,720	160.41	9.62
合計 (%)	49 (0.1)	112 (0.2)	504 (0.8)	1,947 (3.0)	4,984 (7.8)	8,550 (13.4)	10,332 (16.2)	12,504 (19.5)	11,977 (18.7)	8,599 (13.4)	3,312 (5.2)	912 (1.4)	162 (0.3)	20 (0.0)	63,964 (100.0)	4,410	68,374	161.08	9.48
記載なし (%)																			
総計 (%)	49 (0.1)	112 (0.2)	504 (0.8)	1,947 (3.0)	4,984 (7.8)	8,550 (13.4)	10,332 (16.2)	12,504 (19.5)	11,977 (18.7)	8,599 (13.4)	3,312 (5.2)	912 (1.4)	162 (0.3)	20 (0.0)	63,964 (100.0)	4,410	68,374	161.08	9.48

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
 ##D2033##  
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
 2016年調査