

表 909 身長(cm) 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	6 (0.3)	3 (0.1)	19 (0.9)	49 (2.3)	158 (7.5)	261 (12.4)	364 (17.3)	411 (19.5)	414 (19.6)	269 (12.8)	118 (5.6)	33 (1.6)	1 (0.0)	2 (0.1)	2,108 (100.0)	558	2,666	161.27	9.77
慢性腎盂腎炎 (%)		1 (1.2)		7 (8.3)	11 (13.1)	15 (17.9)	19 (22.6)	14 (16.7)	9 (10.7)	6 (7.1)	1 (1.2)	1 (1.2)			84 (100.0)	13	97	156.55	9.50
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1 (2.1)		1 (2.1)	2 (4.2)	2 (4.2)	7 (14.6)	9 (18.8)	9 (18.8)	7 (14.6)	8 (16.7)	1 (2.1)	1 (2.1)			48 (100.0)	13	61	159.75	10.51
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)					5 (23.8)	8 (38.1)	6 (28.6)	2 (9.5)							21 (100.0)	3	24	152.90	5.08
その他の分類不能の腎炎 (%)	5 (7.8)		1 (1.6)	2 (3.1)		5 (12.5)	7 (10.9)	14 (21.9)	13 (20.3)	6 (9.4)	2 (3.1)	1 (1.6)			64 (100.0)	11	75	156.47	17.86
多発性嚢胞腎 (%)	6 (2.8)		2 (0.9)	6 (2.8)	8 (3.7)	23 (10.7)	36 (16.7)	32 (14.9)	38 (17.7)	35 (16.3)	22 (10.2)	5 (2.3)	2 (0.9)		215 (100.0)	57	272	161.35	16.14
腎硬化症 (%)		4 (0.5)	13 (1.6)	40 (4.8)	70 (8.4)	119 (14.2)	134 (16.0)	178 (21.3)	139 (16.6)	104 (12.4)	29 (3.5)	5 (0.6)	1 (0.1)		836 (100.0)	270	1,106	159.68	9.51
悪性高血圧 (%)			3 (3.8)	1 (1.3)	3 (3.8)	11 (14.1)	14 (17.9)	15 (19.2)	14 (17.9)	12 (15.4)	4 (5.1)	1 (1.3)			78 (100.0)	28	106	161.24	9.53
糖尿病性腎症 (%)		2 (0.1)	11 (0.5)	45 (2.1)	101 (4.8)	202 (9.5)	288 (13.6)	446 (21.0)	495 (23.4)	333 (15.7)	152 (7.2)	40 (1.9)	3 (0.1)	1 (0.0)	2,119 (100.0)	627	2,746	163.23	8.87
SLE腎炎 (%)			1 (2.9)	2 (5.7)	2 (5.7)	4 (11.4)	10 (28.6)	6 (17.1)	8 (22.9)	2 (5.7)					35 (100.0)	20	55	158.31	8.16
アミロイド腎 (%)			1 (9.1)	1 (9.1)		2 (18.2)	5 (45.5)			1 (9.1)	1 (9.1)				11 (100.0)	5	16	156.64	10.94
痛風腎 (%)				1 (5.9)		2 (11.8)	2 (11.8)	3 (17.6)	4 (23.5)	5 (29.4)					17 (100.0)	6	23	162.88	8.40
先天性代謝異常による腎不全 (%)	2 (13.3)		1 (6.7)		1 (6.7)	2 (13.3)	4 (26.7)	2 (13.3)	2 (13.3)	1 (6.7)					15 (100.0)	2	17	149.73	23.05
腎・尿路結核 (%)																1	1		
腎・尿路結石 (%)					1 (5.3)	3 (15.8)	3 (15.8)	2 (10.5)	7 (36.8)	3 (15.8)					19 (100.0)	2	21	161.84	7.51
腎・尿路腫瘍 (%)				1 (9.1)	1 (9.1)	1 (9.1)	1 (9.1)	3 (27.3)	3 (27.3)	1 (9.1)					11 (100.0)	1	12	160.18	9.98
閉塞性尿路障害 (%)	2 (12.5)					2 (12.5)		3 (18.8)	5 (31.3)	2 (12.5)	1 (6.3)	1 (6.3)			16 (100.0)	4	20	158.13	24.10
骨髄腫 (%)					2 (28.6)	3 (42.9)			1 (14.3)			1 (14.3)			7 (100.0)		7	156.43	12.91
腎形成不全 (%)	21 (40.4)	2 (3.8)	1 (1.9)	2 (3.8)	3 (5.8)	6 (11.5)	3 (5.8)	5 (9.6)	2 (3.8)	5 (9.6)	1 (1.9)	1 (1.9)			52 (100.0)	13	65	131.56	35.42
不明 (%)	2 (0.3)	2 (0.3)	9 (1.4)	26 (3.9)	47 (7.1)	95 (14.3)	110 (16.5)	153 (23.0)	118 (17.7)	66 (9.9)	31 (4.7)	6 (0.9)	1 (0.2)		666 (100.0)	223	889	160.12	9.47
再導入 (%)				1 (1.8)	1 (1.8)	8 (14.3)	11 (19.6)	10 (17.9)	12 (21.4)	7 (12.5)	5 (8.9)	1 (1.8)			56 (100.0)	9	65	162.75	8.77
その他 (%)	17 (9.3)	1 (0.5)	6 (3.3)	8 (4.4)	12 (6.6)	20 (11.0)	32 (17.6)	30 (16.5)	29 (15.9)	9 (4.9)	14 (7.7)	2 (1.1)	2 (1.1)		182 (100.0)	89	271	153.96	21.82
合計 (%)	62 (0.9)	15 (0.2)	69 (1.0)	194 (2.9)	433 (6.5)	802 (12.0)	1,058 (15.9)	1,338 (20.1)	1,320 (19.8)	875 (13.1)	382 (5.7)	99 (1.5)	10 (0.2)	3 (0.0)	6,660 (100.0)	1,955	8,615	160.96	11.31
記載なし (%)																			
総計 (%)	62 (0.9)	15 (0.2)	69 (1.0)	194 (2.9)	433 (6.5)	802 (12.0)	1,058 (15.9)	1,338 (20.1)	1,320 (19.8)	875 (13.1)	382 (5.7)	99 (1.5)	10 (0.2)	3 (0.0)	6,660 (100.0)	1,955	8,615	160.96	11.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2043##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査