

表 911 透析後体重(kg) 性別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

性別	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	26 (0.0)	2,487 (1.9)	23,683 (18.0)	47,817 (36.4)	34,240 (26.0)	14,482 (11.0)	5,535 (4.2)	1,971 (1.5)	778 (0.6)	271 (0.2)	179 (0.1)	131,469 (100.0)	3,981	135,450	59.95	12.45	
女性 (%)	735 (1.0)	15,009 (20.9)	30,207 (42.0)	16,920 (23.5)	6,152 (8.5)	1,977 (2.7)	628 (0.9)	245 (0.3)	66 (0.1)	32 (0.0)	13 (0.0)	71,984 (100.0)	2,101	74,085	48.14	10.87	
合計 (%)	761 (0.4)	17,496 (8.6)	53,890 (26.5)	64,737 (31.8)	40,392 (19.9)	16,459 (8.1)	6,163 (3.0)	2,216 (1.1)	844 (0.4)	303 (0.1)	192 (0.1)	203,453 (100.0)	6,082	209,535	55.77	13.19	
記載なし (%)													1	1			
総計 (%)	761 (0.4)	17,496 (8.6)	53,890 (26.5)	64,737 (31.8)	40,392 (19.9)	16,459 (8.1)	6,163 (3.0)	2,216 (1.1)	844 (0.4)	303 (0.1)	192 (0.1)	203,453 (100.0)	6,083	209,536	55.77	13.19	

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2110##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査