

表 912 透析後体重(kg) 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

年齢	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)			1 (25.0)	1 (25.0)	2 (50.0)								4 (100.0)	1	5	47.90	9.95
15歳～ (%)		5 (1.1)	60 (12.8)	126 (26.9)	125 (26.7)	79 (16.8)	34 (7.2)	21 (4.5)	9 (1.9)	6 (1.3)	2 (0.4)	2 (0.4)	469 (100.0)	27	496	56.16	16.36
30歳～ (%)		31 (0.4)	304 (4.0)	1,094 (14.4)	1,737 (22.9)	1,686 (22.2)	1,191 (15.7)	768 (10.1)	409 (5.4)	199 (2.6)	93 (1.2)	70 (0.9)	7,582 (100.0)	232	7,814	65.94	18.41
45歳～ (%)		60 (0.2)	1,036 (3.1)	4,665 (13.9)	8,200 (24.5)	8,575 (25.6)	5,783 (17.3)	3,046 (9.1)	1,287 (3.8)	529 (1.6)	177 (0.5)	110 (0.3)	33,468 (100.0)	1,024	34,492	64.53	15.63
60歳～ (%)		175 (0.2)	5,464 (6.1)	21,737 (24.2)	31,124 (34.7)	20,917 (23.3)	7,662 (8.5)	2,045 (2.3)	473 (0.5)	107 (0.1)	30 (0.0)	10 (0.0)	89,744 (100.0)	2,638	92,382	56.25	11.47
75歳～ (%)		397 (0.6)	9,410 (13.8)	24,427 (35.9)	22,672 (33.3)	8,986 (13.2)	1,770 (2.6)	282 (0.4)	38 (0.1)	3 (0.0)	1 (0.0)		67,986 (100.0)	2,038	70,024	50.38	9.80
90歳～ (%)		93 (2.2)	1,221 (29.1)	1,840 (43.8)	877 (20.9)	149 (3.5)	19 (0.5)	1 (0.0)					4,200 (100.0)	121	4,321	44.56	8.32
合計 (%)		761 (0.4)	17,496 (8.6)	53,890 (26.5)	64,737 (31.8)	40,392 (19.9)	16,459 (8.1)	6,163 (3.0)	2,216 (1.1)	844 (0.4)	303 (0.1)	192 (0.1)	203,453 (100.0)	6,081	209,534	55.77	13.19
不明 (%)																	
記載なし (%)														2	2		
総計 (%)		761 (0.4)	17,496 (8.6)	53,890 (26.5)	64,737 (31.8)	40,392 (19.9)	16,459 (8.1)	6,163 (3.0)	2,216 (1.1)	844 (0.4)	303 (0.1)	192 (0.1)	203,453 (100.0)	6,083	209,536	55.77	13.19
平均		75.92	75.77	72.86	69.84	65.83	61.03	56.24	52.67	50.12	48.83	46.76	68.93	68.78	68.93		
標準偏差		14.25	11.56	11.29	11.10	11.10	11.00	10.48	9.35	8.50	8.69	7.28	12.25	12.55	12.26		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
##D2111##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査