

表 916 透析後体重(kg) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

性別	20未満	20 ~	30 ~	40 ~	50 ~	60 ~	70 ~	80 ~	90 ~	100 ~	110 ~	120 ~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)		9 (0.0)	507 (1.2)	6,122 (14.2)	14,890 (34.5)	12,311 (28.5)	5,680 (13.2)	2,241 (5.2)	872 (2.0)	326 (0.8)	127 (0.3)	82 (0.2)	43,167 (100.0)	978	44,145	61.84	12.84
女性 (%)		122 (0.5)	3,886 (16.4)	10,086 (42.6)	6,185 (26.1)	2,268 (9.6)	743 (3.1)	265 (1.1)	88 (0.4)	23 (0.1)	6 (0.0)	2 (0.0)	23,674 (100.0)	555	24,229	49.38	10.75
合計 (%)		131 (0.2)	4,393 (6.6)	16,208 (24.2)	21,075 (31.5)	14,579 (21.8)	6,423 (9.6)	2,506 (3.7)	960 (1.4)	349 (0.5)	133 (0.2)	84 (0.1)	66,841 (100.0)	1,533	68,374	57.43	13.53
記載なし (%)																	
総計 (%)		131 (0.2)	4,393 (6.6)	16,208 (24.2)	21,075 (31.5)	14,579 (21.8)	6,423 (9.6)	2,506 (3.7)	960 (1.4)	349 (0.5)	133 (0.2)	84 (0.1)	66,841 (100.0)	1,533	68,374	57.43	13.53

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2120##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査