

表 917 透析後体重(kg) 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)																	
15歳～ (%)		4 (1.8)	26 (11.5)	66 (29.2)	54 (23.9)	44 (19.5)	11 (4.9)	10 (4.4)	7 (3.1)	2 (0.9)	1 (0.4)	1 (0.4)	226 (100.0)	8	234	55.60	16.92
30歳～ (%)		11 (0.3)	119 (3.3)	570 (15.8)	841 (23.3)	804 (22.3)	547 (15.2)	358 (9.9)	189 (5.2)	87 (2.4)	42 (1.2)	40 (1.1)	3,608 (100.0)	81	3,689	65.74	18.24
45歳～ (%)		11 (0.1)	406 (2.8)	2,164 (14.7)	3,631 (24.7)	3,784 (25.7)	2,495 (17.0)	1,299 (8.8)	573 (3.9)	223 (1.5)	77 (0.5)	38 (0.3)	14,701 (100.0)	333	15,034	64.36	15.42
60歳～ (%)		30 (0.1)	1,672 (5.5)	7,207 (23.5)	10,507 (34.3)	7,417 (24.2)	2,819 (9.2)	752 (2.5)	179 (0.6)	37 (0.1)	13 (0.0)	5 (0.0)	30,638 (100.0)	691	31,329	56.78	11.53
75歳～ (%)		64 (0.4)	1,938 (11.5)	5,834 (34.7)	5,866 (34.9)	2,480 (14.7)	545 (3.2)	87 (0.5)	12 (0.1)				16,826 (100.0)	403	17,229	51.37	9.82
90歳～ (%)		11 (1.3)	232 (27.6)	367 (43.6)	176 (20.9)	50 (5.9)	6 (0.7)						842 (100.0)	17	859	45.47	8.70
合計 (%)		131 (0.2)	4,393 (6.6)	16,208 (24.2)	21,075 (31.5)	14,579 (21.8)	6,423 (9.6)	2,506 (3.7)	960 (1.4)	349 (0.5)	133 (0.2)	84 (0.1)	66,841 (100.0)	1,533	68,374	57.43	13.53
不明 (%)																	
記載なし (%)																	
総計 (%)		131 (0.2)	4,393 (6.6)	16,208 (24.2)	21,075 (31.5)	14,579 (21.8)	6,423 (9.6)	2,506 (3.7)	960 (1.4)	349 (0.5)	133 (0.2)	84 (0.1)	66,841 (100.0)	1,533	68,374	57.43	13.53
平均		71.86	72.87	69.91	67.49	63.89	59.78	55.02	51.84	49.59	48.47	45.60	66.06	66.39	66.07		
標準偏差		17.43	12.41	12.10	11.56	11.32	10.90	10.32	9.18	7.94	8.46	8.13	12.47	12.51	12.47		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
##D2121##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査