

表 920 透析後体重(kg) 医療機関別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

医療機関	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学 (%)			2 (3.8)	16 (30.8)	18 (34.6)	12 (23.1)	1 (1.9)	2 (3.8)	1 (1.9)				52 (100.0)	2	54	55.75	12.44
私立大学 (%)			14 (6.0)	62 (26.7)	70 (30.2)	48 (20.7)	28 (12.1)	8 (3.4)	1 (0.4)			1 (0.4)	232 (100.0)	5	237	57.15	13.15
国立病院機構等 (%)		1 (2.4)	11 (26.2)	8 (19.0)	12 (28.6)	7 (16.7)	3 (7.1)						42 (100.0)	13	55	50.40	13.01
県市町村立・国保 (%)		2 (0.1)	186 (7.6)	627 (25.6)	788 (32.2)	513 (21.0)	209 (8.5)	86 (3.5)	24 (1.0)	5 (0.2)	1 (0.0)	6 (0.2)	2,447 (100.0)	111	2,558	56.37	12.97
JCHO(旧社会保険)等 (%)			41 (7.9)	142 (27.4)	176 (33.9)	95 (18.3)	42 (8.1)	13 (2.5)	7 (1.3)	1 (0.2)	2 (0.4)		519 (100.0)	7	526	55.70	12.90
厚生連等 (%)			115 (8.3)	328 (23.6)	456 (32.8)	289 (20.8)	125 (9.0)	51 (3.7)	13 (0.9)	11 (0.8)	3 (0.2)	1 (0.1)	1,392 (100.0)	79	1,471	56.71	13.47
その他公的 (%)		1 (0.1)	84 (8.3)	244 (24.1)	309 (30.6)	222 (22.0)	83 (8.2)	49 (4.8)	11 (1.1)	5 (0.5)	1 (0.1)	2 (0.2)	1,011 (100.0)	71	1,082	57.03	13.72
私立総合 (%)		1 (0.1)	101 (7.2)	333 (23.6)	466 (33.0)	325 (23.0)	120 (8.5)	35 (2.5)	22 (1.6)	4 (0.3)	3 (0.2)	2 (0.1)	1,412 (100.0)	53	1,465	57.03	12.92
私立 (%)		49 (0.3)	1,358 (7.7)	4,602 (26.1)	5,514 (31.3)	3,720 (21.1)	1,465 (8.3)	539 (3.1)	231 (1.3)	85 (0.5)	27 (0.2)	17 (0.1)	17,607 (100.0)	398	18,005	56.35	13.27
私立診療所 (%)		77 (0.2)	2,481 (5.9)	9,846 (23.4)	13,266 (31.5)	9,348 (22.2)	4,347 (10.3)	1,723 (4.1)	650 (1.5)	238 (0.6)	96 (0.2)	55 (0.1)	42,127 (100.0)	794	42,921	58.01	13.66
総計 (%)		131 (0.2)	4,393 (6.6)	16,208 (24.2)	21,075 (31.5)	14,579 (21.8)	6,423 (9.6)	2,506 (3.7)	960 (1.4)	349 (0.5)	133 (0.2)	84 (0.1)	66,841 (100.0)	1,533	68,374	57.43	13.53

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2124##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査