

表 925 体重(kg) 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	5 (0.3)	2 (0.1)	52 (2.9)	303 (17.1)	563 (31.7)	529 (29.8)	227 (12.8)	71 (4.0)	15 (0.8)	2 (0.1)	4 (0.2)	1 (0.1)	1,774 (100.0)	892	2,666	59.67	12.20
慢性腎盂腎炎 (%)		1 (1.4)	8 (11.4)	23 (32.9)	21 (30.0)	8 (11.4)	6 (8.6)	2 (2.9)		1 (1.4)			70 (100.0)	27	97	53.25	13.96
急速進行性糸球体腎炎 (%)		1 (2.3)	3 (6.8)	10 (22.7)	17 (38.6)	7 (15.9)	5 (11.4)	1 (2.3)					44 (100.0)	17	61	55.31	11.84
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)		1 (5.0)	2 (10.0)	7 (35.0)	4 (20.0)	3 (15.0)	2 (10.0)		1 (5.0)				20 (100.0)	4	24	53.73	15.77
その他の分類不能の腎炎 (%)	2 (3.6)	3 (5.5)	4 (7.3)	15 (27.3)	15 (27.3)	9 (16.4)	3 (5.5)	4 (7.3)					55 (100.0)	20	75	52.90	16.78
多発性嚢胞腎 (%)	5 (2.9)	1 (0.6)	5 (2.9)	20 (11.7)	50 (29.2)	53 (31.0)	24 (14.0)	10 (5.8)	2 (1.2)	1 (0.6)			171 (100.0)	101	272	60.16	14.91
腎硬化症 (%)			21 (2.9)	135 (18.8)	224 (31.2)	202 (28.1)	93 (12.9)	32 (4.5)	10 (1.4)	2 (0.3)			719 (100.0)	387	1,106	59.71	12.26
悪性高血圧 (%)			4 (6.0)	11 (16.4)	13 (19.4)	20 (29.9)	9 (13.4)	8 (11.9)		2 (3.0)			67 (100.0)	39	106	62.72	15.44
糖尿病性腎症 (%)			16 (0.9)	154 (8.6)	488 (25.0)	567 (31.6)	378 (21.1)	140 (7.8)	56 (3.1)	19 (1.1)	10 (0.6)	5 (0.3)	1,793 (100.0)	953	2,746	65.98	13.37
SLE腎炎 (%)			5 (17.2)	6 (20.7)	7 (24.1)	8 (27.6)	2 (6.9)	1 (3.4)					29 (100.0)	26	55	55.06	12.67
アミロイド腎 (%)				4 (36.4)	1 (9.1)	6 (54.5)							11 (100.0)	5	16	55.28	8.89
痛風腎 (%)			1 (7.1)	1 (7.1)	3 (21.4)	4 (28.6)	5 (35.7)						14 (100.0)	9	23	62.52	12.33
先天性代謝異常による腎不全 (%)	2 (15.4)	1 (7.7)	2 (15.4)	2 (15.4)	3 (23.1)	2 (15.4)			1 (7.7)				13 (100.0)	4	17	46.46	23.42
腎・尿路結核 (%)														1	1		
腎・尿路結石 (%)				2 (13.3)	4 (26.7)	4 (26.7)	4 (26.7)		1 (6.7)				15 (100.0)	6	21	62.55	12.37
腎・尿路腫瘍 (%)					1 (11.1)	5 (55.6)	3 (33.3)						9 (100.0)	3	12	67.09	8.03
閉塞性尿路障害 (%)	2 (16.7)			1 (8.3)	2 (16.7)	3 (25.0)	2 (16.7)	2 (16.7)					12 (100.0)	8	20	57.70	22.95
骨髄腫 (%)				3 (60.0)	1 (20.0)	1 (20.0)							5 (100.0)	2	7	49.46	7.37
腎形成不全 (%)	17 (39.5)	1 (2.3)	5 (11.6)	4 (9.3)	7 (16.3)	4 (9.3)	2 (4.7)	1 (2.3)	1 (2.3)	1 (2.3)			43 (100.0)	22	65	38.32	26.57
不明 (%)		4 (0.8)	11 (2.1)	105 (19.8)	165 (31.1)	139 (26.2)	71 (13.4)	23 (4.3)	8 (1.5)	2 (0.4)	1 (0.2)	1 (0.2)	530 (100.0)	359	889	59.87	13.13
再導入 (%)			1 (2.7)	8 (21.6)	15 (40.5)	10 (27.0)	2 (5.4)		1 (2.7)				37 (100.0)	28	65	57.40	11.30
その他 (%)	14 (8.5)	5 (3.0)	18 (10.9)	28 (17.0)	33 (20.0)	41 (24.8)	19 (11.5)	4 (2.4)	3 (1.8)				165 (100.0)	106	271	52.70	19.03
合計 (%)	47 (0.8)	20 (0.4)	158 (2.8)	842 (15.0)	1,597 (28.5)	1,625 (29.0)	857 (15.3)	299 (5.3)	99 (1.8)	30 (0.5)	15 (0.3)	7 (0.1)	5,596 (100.0)	3,019	8,615	61.13	13.97
記載なし (%)																	
総計 (%)	47 (0.8)	20 (0.4)	158 (2.8)	842 (15.0)	1,597 (28.5)	1,625 (29.0)	857 (15.3)	299 (5.3)	99 (1.8)	30 (0.5)	15 (0.3)	7 (0.1)	5,596 (100.0)	3,019	8,615	61.13	13.97

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2214##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査