

表 926 体重減少量(kg) 性別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

性別	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	432 (0.4)	4,081 (4.1)	19,482 (19.5)	40,272 (40.4)	26,054 (26.1)	7,376 (7.4)	1,539 (1.5)	330 (0.3)	80 (0.1)	29 (0.0)	99,675 (100.0)	2,815	102,490	2.63	1.04
女性 (%)	307 (0.5)	3,762 (6.6)	19,394 (34.0)	25,551 (44.8)	6,968 (12.2)	930 (1.6)	113 (0.2)	20 (0.0)	7 (0.0)	5 (0.0)	57,057 (100.0)	1,586	58,643	2.12	0.83
合計 (%)	739 (0.5)	7,843 (5.0)	38,876 (24.8)	65,823 (42.0)	33,022 (21.1)	8,306 (5.3)	1,652 (1.1)	350 (0.2)	87 (0.1)	34 (0.0)	156,732 (100.0)	4,401	161,133	2.45	1.00
記載なし (%)															
総計 (%)	739 (0.5)	7,843 (5.0)	38,876 (24.8)	65,823 (42.0)	33,022 (21.1)	8,306 (5.3)	1,652 (1.1)	350 (0.2)	87 (0.1)	34 (0.0)	156,732 (100.0)	4,401	161,133	2.45	1.00

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2310##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査