

表 927 体重減少量(kg) 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

年齢	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)		1 (33.3)	2 (66.7)								3 (100.0)		3	0.97	0.75
15歳～ (%)	4 (1.4)	13 (4.6)	51 (18.0)	101 (35.6)	74 (26.1)	29 (10.2)	12 (4.2)				284 (100.0)	16	300	2.74	1.18
30歳～ (%)	31 (0.6)	148 (2.6)	678 (12.1)	1,704 (30.5)	1,756 (31.4)	898 (16.1)	276 (4.9)	74 (1.3)	14 (0.3)	6 (0.1)	5,585 (100.0)	168	5,753	3.12	1.22
45歳～ (%)	117 (0.4)	793 (3.0)	3,786 (14.5)	8,714 (33.3)	8,125 (31.0)	3,508 (13.4)	889 (3.4)	206 (0.8)	43 (0.2)	11 (0.0)	26,192 (100.0)	761	26,953	2.95	1.14
60歳～ (%)	287 (0.4)	3,116 (4.4)	16,302 (22.9)	31,304 (44.0)	16,455 (23.1)	3,237 (4.5)	411 (0.6)	55 (0.1)	22 (0.0)	10 (0.0)	71,199 (100.0)	1,991	73,190	2.47	0.93
75歳～ (%)	274 (0.5)	3,415 (6.8)	16,659 (33.1)	22,800 (45.3)	6,433 (12.8)	622 (1.2)	64 (0.1)	14 (0.0)	8 (0.0)	7 (0.0)	50,296 (100.0)	1,380	51,676	2.13	0.82
90歳～ (%)	26 (0.8)	357 (11.3)	1,398 (44.1)	1,200 (37.8)	179 (5.6)	12 (0.4)		1 (0.0)			3,173 (100.0)	85	3,258	1.82	0.76
合計 (%)	739 (0.5)	7,843 (5.0)	38,876 (24.8)	65,823 (42.0)	33,022 (21.1)	8,306 (5.3)	1,652 (1.1)	350 (0.2)	87 (0.1)	34 (0.0)	156,732 (100.0)	4,401	161,133	2.45	1.00
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	739 (0.5)	7,843 (5.0)	38,876 (24.8)	65,823 (42.0)	33,022 (21.1)	8,306 (5.3)	1,652 (1.1)	350 (0.2)	87 (0.1)	34 (0.0)	156,732 (100.0)	4,401	161,133	2.45	1.00
平均	69.80	72.80	72.51	69.86	64.64	58.37	53.89	52.43	55.63	61.26	68.74	68.43	68.73		
標準偏差	13.51	11.71	11.19	11.23	11.59	11.23	10.58	10.55	12.14	14.80	12.06	12.32	12.07		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
##D2311##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査