

表 928 体重減少量(kg) 透析歴(年)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析歴	0.0未満	0.0 ~	1.0 ~	2.0 ~	3.0 ~	4.0 ~	5.0 ~	6.0 ~	7.0 ~	8.0 ~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年末満 (%)															
2年 ~ (%)	311 (0.6)	3,105 (6.0)	13,214 (25.5)	21,212 (40.9)	10,526 (20.3)	2,809 (5.4)	577 (1.1)	112 (0.2)	32 (0.1)	13 (0.0)	51,911 (100.0)	1,451	53,362	2.41	1.03
5年 ~ (%)	234 (0.5)	2,369 (4.6)	11,795 (23.0)	21,320 (41.6)	11,575 (22.6)	3,139 (6.1)	659 (1.3)	154 (0.3)	40 (0.1)	15 (0.0)	51,300 (100.0)	1,424	52,724	2.52	1.02
10年 ~ (%)	84 (0.3)	1,089 (4.2)	6,072 (23.4)	11,159 (43.0)	5,838 (22.5)	1,418 (5.5)	252 (1.0)	58 (0.2)	8 (0.0)	3 (0.0)	25,981 (100.0)	726	26,707	2.50	0.97
15年 ~ (%)	58 (0.4)	557 (4.1)	3,426 (25.3)	6,003 (44.4)	2,785 (20.6)	568 (4.2)	112 (0.8)	15 (0.1)	3 (0.0)	3 (0.0)	13,530 (100.0)	418	13,948	2.42	0.93
20年 ~ (%)	26 (0.4)	332 (4.6)	1,992 (27.9)	3,166 (44.3)	1,349 (18.9)	239 (3.3)	37 (0.5)	7 (0.1)	1 (0.0)		7,149 (100.0)	202	7,351	2.34	0.89
25年 ~ (%)	15 (0.4)	168 (4.6)	1,147 (31.6)	1,619 (44.6)	570 (15.7)	98 (2.7)	9 (0.2)	3 (0.1)	1 (0.0)		3,630 (100.0)	93	3,723	2.24	0.86
30年 ~ (%)	5 (0.3)	109 (5.7)	688 (35.9)	807 (42.1)	278 (14.5)	25 (1.3)	3 (0.2)	1 (0.1)	2 (0.1)		1,918 (100.0)	51	1,969	2.15	0.83
35年 ~ (%)	6 (0.6)	80 (8.3)	381 (39.4)	407 (42.1)	82 (8.5)	8 (0.8)	3 (0.3)				967 (100.0)	29	996	1.98	0.78
40年 ~ (%)		34 (9.8)	161 (46.5)	130 (37.6)	19 (5.5)	2 (0.6)					346 (100.0)	7	353	1.88	0.71
合計 (%)	739 (0.5)	7,843 (5.0)	38,876 (24.8)	65,823 (42.0)	33,022 (21.1)	8,306 (5.3)	1,652 (1.1)	350 (0.2)	87 (0.1)	34 (0.0)	156,732 (100.0)	4,401	161,133	2.45	1.00
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	739 (0.5)	7,843 (5.0)	38,876 (24.8)	65,823 (42.0)	33,022 (21.1)	8,306 (5.3)	1,652 (1.1)	350 (0.2)	87 (0.1)	34 (0.0)	156,732 (100.0)	4,401	161,133	2.45	1.00
平均	7.65	8.44	9.34	9.04	8.52	7.78	7.39	7.23	7.09	6.79	8.88	8.88	8.88		
標準偏差	6.69	7.50	7.81	7.10	6.30	5.46	5.10	4.84	5.67	4.55	7.06	7.01	7.06		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2312##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査