

表 929 体重減少量(kg) 原疾患別(施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

原疾患	0.0未満	0.0~	1.0~	2.0~	3.0~	4.0~	5.0~	6.0~	7.0~	8.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎	192 (%) (0.4)	2,218 (4.6)	12,524 (26.1)	20,824 (43.4)	9,675 (20.2)	2,061 (4.3)	371 (0.8)	63 (0.1)	15 (0.0)	5 (0.0)	47,948 (100.0)	1,285	49,233	2.40	0.94
慢性腎盂腎炎	14 (%) (0.9)	99 (6.5)	444 (29.0)	634 (41.5)	271 (17.7)	54 (3.5)	11 (0.7)	2 (0.1)			1,529 (100.0)	24	1,553	2.27	0.97
急速進行性糸球体腎炎	9 (%) (0.8)	83 (7.1)	347 (29.7)	483 (41.3)	207 (17.7)	31 (2.7)	8 (0.7)			1 (0.1)	1,169 (100.0)	42	1,211	2.26	0.95
妊娠腎/妊娠中毒症	1 (%) (0.1)	26 (3.3)	266 (33.5)	375 (47.2)	109 (13.7)	14 (1.8)	3 (0.4)				794 (100.0)	16	810	2.22	0.75
その他の分類不能の腎炎	6 (%) (0.9)	36 (5.2)	172 (24.9)	297 (43.0)	139 (20.1)	34 (4.9)	4 (0.6)	2 (0.3)			690 (100.0)	19	709	2.38	1.00
多発性囊胞腎	22 (%) (0.4)	303 (5.0)	1,664 (27.3)	2,741 (45.0)	1,119 (18.4)	213 (3.5)	25 (0.4)	6 (0.1)	2 (0.0)	1 (0.0)	6,096 (100.0)	141	6,237	2.34	0.90
腎硬化症	54 (%) (0.4)	870 (6.1)	4,033 (28.1)	6,135 (42.8)	2,537 (17.7)	586 (4.1)	91 (0.6)	36 (0.3)	5 (0.0)	2 (0.0)	14,349 (100.0)	342	14,691	2.33	0.96
悪性高血圧	6 (%) (0.5)	53 (4.0)	274 (20.7)	513 (38.8)	306 (23.1)	130 (9.8)	31 (2.3)	8 (0.6)	2 (0.2)		1,323 (100.0)	46	1,369	2.68	1.11
糖尿病性腎症	262 (%) (0.4)	2,753 (4.6)	13,089 (21.6)	24,570 (40.6)	14,456 (23.9)	4,197 (6.9)	912 (1.5)	189 (0.3)	52 (0.1)	18 (0.0)	60,498 (100.0)	1,739	62,237	2.57	1.04
SLE腎炎	6 (%) (0.6)	57 (5.4)	326 (30.7)	470 (44.2)	167 (15.7)	29 (2.7)	6 (0.6)	2 (0.2)			1,063 (100.0)	32	1,095	2.25	0.90
アミロイド腎	5 (%) (2.6)	18 (9.4)	61 (31.8)	79 (41.1)	23 (12.0)	23 (2.1)	4 (0.5)	1 (0.5)			192 (100.0)	4	196	2.09	1.03
痛風腎	7 (%) (1.2)	27 (4.7)	128 (22.1)	263 (45.5)	123 (21.3)	21 (3.6)	7 (1.2)	2 (0.3)			578 (100.0)	19	597	2.43	0.99
先天性代謝異常による腎不全	3 (%) (2.2)	11 (8.2)	26 (19.4)	62 (46.3)	26 (19.4)	6 (4.5)					134 (100.0)	3	137	2.35	1.04
腎・尿路結核	6 (%) (6.7)	36 (40.0)	33 (36.7)	14 (15.6)	1 (1.1)						90 (100.0)	4	94	2.07	0.82
腎・尿路結石	3 (%) (1.0)	22 (7.5)	80 (27.3)	134 (45.7)	47 (16.0)	7 (2.4)					293 (100.0)	11	304	2.20	0.89
腎・尿路腫瘍	2 (%) (0.5)	27 (6.2)	98 (22.5)	189 (43.4)	103 (23.7)	14 (3.2)			2 (0.5)		435 (100.0)	7	442	2.41	0.94
閉塞性尿路障害	3 (%) (0.9)	33 (9.5)	87 (25.1)	128 (36.9)	77 (22.2)	14 (4.0)	4 (1.2)			1 (0.3)	347 (100.0)	8	355	2.32	1.14
骨髄腫	2 (%) (2.2)	12 (13.3)	24 (26.7)	36 (40.0)	14 (15.6)	1 (1.1)	1 (1.1)				90 (100.0)	2	92	2.02	1.11
腎形成不全	2 (%) (0.6)	19 (5.9)	75 (23.3)	137 (42.5)	63 (19.6)	22 (6.8)	4 (1.2)				322 (100.0)	4	326	2.46	1.03
不明	103 (%) (0.7)	889 (6.3)	3,930 (27.8)	5,828 (41.2)	2,602 (18.4)	625 (4.4)	126 (0.9)	26 (0.2)	9 (0.1)	4 (0.0)	14,142 (100.0)	534	14,676	2.33	1.01
再導入	4 (%) (0.4)	26 (2.8)	217 (23.1)	381 (40.5)	238 (25.3)	64 (6.8)	7 (0.7)	3 (0.3)			940 (100.0)	27	967	2.59	0.98
その他	33 (%) (0.9)	255 (6.9)	975 (26.3)	1,511 (40.7)	706 (19.0)	178 (4.8)	40 (1.1)	8 (0.2)	2 (0.1)	2 (0.1)	3,710 (100.0)	92	3,802	2.36	1.04
合計	739 (%) (0.5)	7,843 (5.0)	38,876 (24.8)	65,823 (42.0)	33,022 (21.1)	8,306 (5.3)	1,652 (1.1)	350 (0.2)	87 (0.1)	34 (0.0)	156,732 (100.0)	4,401	161,133	2.45	1.00
記載なし															
総計	739 (%) (0.5)	7,843 (5.0)	38,876 (24.8)	65,823 (42.0)	33,022 (21.1)	8,306 (5.3)	1,652 (1.1)	350 (0.2)	87 (0.1)	34 (0.0)	156,732 (100.0)	4,401	161,133	2.45	1.00

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2313#

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査